

الجمهوريّة العربيّة السوریّة
وزارة التربية
المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية

الرياضيات

الجبر

كتاب الطالب
الصف الأول الثانوي

م 2017 – 2016
هـ 1437

حقوق التأليف والنشر محفوظة

لوزارة التربية في الجمهورية العربية السورية



حقوق الطبع والتوزيع محفوظة

للمؤسسة العامة للطباعة

طبع أول مرة للعام الدراسي 2013 - 2014 م

المؤلفون

ميكانيل الحمود	أ.د. عمران قوبا
مروان بركة	بسام بركات
غدير اندراؤس	شحادة آله رشي
محمد ناصر	عصام علي
أمانى حسن	

مُقدمة

تقدُّمُ الرِّياضيَّاتِ الأدواتِ لِنمذجةِ الظواهرِ ولِلتَّبُؤِ بالنتائجِ، وخصوصاً في مجالاتِ العلومِ التجريبيةِ والتقانيةِ، وذلك لأنّها تتيح تطويرَ العديدِ من عناصرِ المعرفةِ. فهي تتغذى على المسائلِ التي تنشأُ من السعيِ وراءِ تحقيقِ فهمٍ أفضلَ للعالمِ المحيطِ بنا. كما إنَّ تطورَها مرتبٌ في الوقتِ نفسهِ، وإلى حدٍ كبيرٍ، بقدرةِ الإنسانِ على استكشافِ المفاهيمِ النظريةِ العميقَةِ.

ونجدُ في تاريخِ البشريةِ نقاطاً مضيئةً تشيرُ إلى قدرةِ الإنسانِ على اصطناعِ الأدواتِ التي تتيحُ له تحقيقَ فهمٍ أفضلَ للعالمِ المحيطِ به، وتسمحُ له أن يكونَ مؤثراً تأثيراً أكثرَ فعاليةً في محيطِه. منذ البدءِ كانتُ الرِّياضيَّاتِ، إلى جانبِ اللُّغةِ، واحدةً منَ الحوامِلِ الرئيسةِ للجهدِ الذي بذلهُ الإنسانُ في وضعِ المفاهيمِ الأساسيةِ. لذلك يُنْتَظِرُ من طلابِنا في نهايةِ مرحلةِ دراستِهم ما قبلِ الجامعيةِ، أن يكونوا قد اكتسبُوا المبادئِ الأساسيةِ للتفكيرِ الرياضيِّ، وهي تعتمدُ على كُمٍ معرفيٍّ جيدٍ، ودراءةٍ بطرائقِ حلِّ المسائلِ، وبأساليبِ البرهانِ المعتمدِ على الاستنتاجِ المنطقيِّ، دونَ أن يكونَ ذلكُ بالضرورةِ مقترباً بدراسةِ ما يُعرفُ باسمِ المنطقِ الرياضيِّ.

تحتفظُ الرِّياضيَّاتِ بعلاقاتٍ وثيقةٍ معَ العلومِ الأخرىِ والتقانةِ، إذ تُتيحُ لغةُ الرِّياضيَّاتِ وصفَ ظواهرِ الطبيعةِ ونمذجتها، وهي تتمايزُ عنها لأنَّ الرِّياضيَّاتِ تُولِّفُ بحدِّ ذاتِها فرعاً ذا هويَّةً خاصَّةً مستقلَّةً.

ويحثُّ الإثباتُ المعتمدُ على الاستنتاجِ الرياضيِّ موقعاً أساسياً في الرِّياضيَّاتِ، إذ لا يكفيُ التيقُّنُ من صحةِ الخواصِ اعتماداً على بعضِ الأمثلةِ. يقودُ تعلُّمِ الرِّياضيَّاتِ

وتعلّمها الطّلاب إلى تذوّق ذلك الشّعور الرّائع الذي يشعر به المرء عند إثبات صحة قضيّةٍ بالبرهان القاطع اعتماداً على المناقشة المنطقية. ممارسةِ الرياضيات هي امتلاك ناصيتها اعتماداً على الخيال والبحث، والتحسّن والاستكشاف، الشّعور بمحنة الاكتشاف، وحل المسائل بدقةٍ ومنطقاً.

لقد سعينا في هذا الكتاب، إلى تقديم أداة تعليمٍ للرياضيات، يمكن أن تستعمل أيضاً وفي الوقت ذاته، أداةً تعلم ذاتيًّا. ننصح أن يكون الكتاب أداة العمل الرئيسة، فتجري قراءةُ فقراتِ الدرس من الكتاب، ومناقشةُ الطّلاب في فحوى ما يقرأ، حيث يؤدّي المُدرّس دور مدیر الحوار والنقاش الذي من المفترض أن يؤدّي إلى فهمٍ أعمقَ للدرس، ويُطلب من الطّلاب حلُّ التّدريبات مع تقدم الدرس.

ولمّا كان تعلم طرائق الاستكشاف والبحث هدفاً أساسياً من أهدافنا، فقد زوّدنا كلَّ بحثٍ بعدد من المسائل والتمرينات التي جرى فيها توجيهه تفكير الطّالب نحو الحلّ، آملين تمكين الطّالب من طرائق التّفكير العلمي التي يفيده اتباعها أيًّا كانت أنماط المسائل التي تواجهه مستقبلاً.

وأخيراً، نرجو من الزّملاء المدرّسين ومن الأعزّاء الطّلاب أن يزودونا بأيّ ملاحظةٍ أو انتقادٍ بناءً على فحوى أو طرائق هذا الكتاب حتى تؤخذ في الحسبان.

المُعدّون

المحتوى

7	① الأعداد الحقيقة وخواصها
9	➊ مجموعات الأعداد
12	➋ العبارات الجبرية
14	➌ المعادلات الجبرية
16	➍ الترتيب في مجموعة الأعداد الحقيقة
27	تمرينات ومسائل
33	② مفهوم التابع
35	➊ مقدمة عامة
37	➋ مفهوم التابع العددي
40	➌ الخط البياني لتابع
45	➍ التابع المتزايد والتابع المتناقص
50	➎ جدول اطراد تابع
54	تمرينات ومسائل
59	③ المعادلات والمتراجحات من الدرجة الثانية
61	➊ حل معادلة من الدرجة الثانية
66	➋ تحليل ثلاثي الحدود من الدرجة الثانية وإشارته
69	➌ العلاقة بين أمثل وجدور ثلاثي حدود من الدرجة الثانية
71	➍ تطبيقات ونشاطات
74	تمرينات ومسائل
79	④ التوابع المألوفة
81	➊ التوابع الحدودية من الدرجة الثانية
86	➋ تابع المقلوب
89	➌ المستقيم الحقيقي والم دائرة المثلثية
94	➍ النسب المثلثية لعدد حقيقي
100	تمرينات ومسائل
107	⑤ مبادئ في الاحتمالات
109	➊ مقدمة
111	➋ عناصر الاحتمال
141	➌ قانون الاحتمال
122	تمرينات ومسائل

1

الأعداد الحقيقة و خواصها

مجموعات الأعداد 


العبارات الجبرية 

المعادلات الجبرية 

الترتيب في مجموعة الأعداد الحقيقة 

قبل حوالي ستة آلاف سنة، بدأ المزارعون في بابل في بلاد الرافدين باستعمال الرموز لتسجيل اتفاقياتهم وتعاملاتهم التجارية على سجلات من الصلصال.

وكانت لديهم رموز مختلفة للتعبير عن أشياء مختلفة.



فربما كان الشكل البيضاوي يرمز إلى كيسٍ من القمح،



وربما كانت الدائرة ترمز إلى جرّة من زيت الزيتون.

مع تطور الأدوات بدأ البابليون باستعمال رموز لتمثيل الأعداد فكتبوا ፩ دلالة على العدد 1، وكتبوا ፻ دلالة على العدد 2، و ፻፻ على العدد 3، و ፻፻፻ على العدد 4، وهكذا... وعندما وصلوا إلى العدد 10 أداروا الرمز وكتبوه ▶. ولما وصلوا إلى العدد 60 قلبوه الرمز مجدداً وكتبوه ፭. أمّا العدد 99 فكانوا يكتبونه كالآتي :



مقدمة في الأعداد الحقيقة و خواصها

مجموعات الأعداد



① نرمز إلى **مجموعة الأعداد الطبيعية** بالرمز \mathbb{N} وهي تشمل الأعداد :
 $\{1, 2, \dots, 36, 37, \dots, 1024, \dots\}$

يُعد العدد الطبيعي الأشياء ضمن مجموعة، فهو 0 إذا لم يكن لدينا أي شيء، وهو 1 إذا كان لدينا شيء واحد، و 2 إذا كان لدينا شيئاً، وهكذا
تحوي هذه المجموعة **مجموعة الأعداد الأولية** $\{2, 3, 5, 7, 11, \dots\} = \mathbb{P}$ ، التي درستها سابقاً.

② نرمز إلى **مجموعة الأعداد الصحيحة** بالرمز \mathbb{Z} وهي تشمل الأعداد :
 $\{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$

تُمثل الأعداد الصحيحة تدريجات مستقيم مدرج بالوحدات، ويكون كل عدد صحيح من عدد طبيعي مسبق بإشارة.



وهي تحوي العديد من المجموعات الجزئية الشهيرة، مثل مجموعة الأعداد الصحيحة الزوجية، ومجموعة الأعداد الصحيحة الفردية، ومجموعة الأعداد الصحيحة السالبة.

③ نرمز إلى **مجموعة الأعداد العشرية** بالرمز \mathbb{D} وهي الأعداد التي تنتج من قسمة عدد صحيح على قوة للعدد 10، أي تلك الأعداد التي يمكن كتابتها بالصيغة $\frac{p}{10^n}$ حيث p عدد صحيح و n عدد طبيعي. يكتب كل عدد من هذه الأعداد "كتابة عشرية" مكونة من جزء صحيح، وفاصلة، وجزء عشري مُنتهٍ لا يحوي أصفاراً لا لزوم لها، مثل

$$d = \frac{-310034}{10^3} = \underbrace{-310}_{\text{جزء عشري}}.\underbrace{034}_{\text{جزء صحيح}}$$

٤ نرمز إلى **مجموعة الأعداد العادية** بالرمز \mathbb{Q} وهي الأعداد التي تنتج من قسمة عدد صحيح على عدد طبيعي موجب تماماً، أي تلك الأعداد التي يمكن كتابتها بالصيغة $\frac{a}{b}$ حيث a عدد صحيح و b عدد طبيعي لا يساوي 0. ونقول إن هذه الكتابة **مُختزلة** أو إنها في **أبسط صورة** إذا كان العددان a و b أولايان فيما بينهما، أي إذا كان قاسمهما المشترك الأكبر مساوياً 1. لكل عدد عادي غير عشري كتابة عشرية دورية غير منتهية، أي إن خاناته تتكرر بدءاً من حد معين فمثلاً :

$$-\frac{2399}{220} = -10.90\overline{4545454545}\dots$$


$$\frac{18}{7} = 2.571428\overline{571428571428571428}\dots$$

٥ وأخيراً نرمز إلى **مجموعة الأعداد الحقيقة** بالرمز \mathbb{R} وهي تضم جميع الأعداد التي يمكن أن تكون قد رأيتها في دراستك السابقة، وتشمل جميع الأعداد العادية، وغير العادية مثل $\sqrt{2}$ و π و $\cos(11^\circ)$ وغيرها.

يُوافق كل عدد حقيقي نقطة وحيدة على مستقيم مدرج؛ وبالعكس، كل نقطة من مستقيم مدرج توافق عدداً حقيقياً وحيداً نسميه **فاصلة** هذه النقطة.



ما العلاقة بين المجموعات العددية المختلفة ؟



- كل عدد عادي هو عدد حقيقي. نقول إن المجموعة \mathbb{Q} **محتوة** في المجموعة \mathbb{R} ، ونرمز إلى ذلك بالرمز $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. تذكر أن $X \subset Y$: المجموعة X محتوة في المجموعة Y ، وهذا يعني أن كل عنصر من X ينتمي أيضاً إلى Y .

- كل عدد عشري هو عدد عادي. لأنه يمكن بالشكل $\frac{a}{10^n}$ حيث a من \mathbb{Z} و n من \mathbb{N} . نكتب إذن $\mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$.
 - كل عدد صحيح هو كسر عشري. نكتب إذن $\mathbb{Z} \subset \mathbb{D}$.
 - كل عدد طبيعي هو عدد صحيح. نكتب إذن $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$.
- إذن لدينا : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

كيف نعيّن طبيعة عددٍ مُعطى، أي إلى أيِّ مجموعات الأعداد ينتمي؟

عيّن طبيعة كل من الأعداد الآتية : $\frac{21}{560}, \frac{5}{3}, \frac{32}{4}, \frac{(\sqrt{7} + 4)(\sqrt{7} - 4)}{3}, \pi$

لتعيين طبيعة عدد نبحث عن أصغر مجموعة من بين مجموعات الأعداد التي درسناها سابقاً ينتمي إليها هذا العدد، وفي كثير من الحالات يكون من المناسب اختزال العدد مع المحافظة على قيمته الفعلية (دون تقرير).



الحل

- العدد $\frac{21}{560}$. نلاحظ أنَّ $\frac{21}{560} = \frac{7 \times 3}{7 \times 8 \times 10} = \frac{3}{8 \times 10} = 0.0375 \in \mathbb{D}$ فهو إذن عددٌ عشري.
- العدد $\frac{5}{3}$ ينتمي إلى \mathbb{Q} . ولأنَّ كتابته العشرية... $\frac{5}{3} = 1.66666$ دورية غير منتهية، فهو لا ينتمي إلى \mathbb{D} .
- العدد $\frac{32}{4}$ يساوي 8. فهو ينتمي إلى \mathbb{N} .
- العدد $\frac{7 - 16}{3} = \frac{-9}{3} = -3$ يساوي $\frac{(\sqrt{7} + 4)(\sqrt{7} - 4)}{3}$ فهو إذن عدد صحيح.
- العدد π عددٌ حقيقي غير عادي وهو من ثم لا ينتمي إلى أيٌّ من المجموعات \mathbb{N} أو \mathbb{Z} أو \mathbb{D} .

تجربة

① بين الصواب من الخطأ في المقولات التالية معللاً إجابتك :

① كلُّ كسرٍ عشري هو عددٌ عادي.

② مقلوب عددٍ عادي غير معدوم هو عددٌ عادي.

③ كلُّ عددٍ صحيح هو عددٌ عشري.

④ مقلوب عددٍ عشري غير معدوم هو عددٌ عشري.

② اختزل الكسور التالية واكتبهما بأبسط صيغة :

$$\begin{array}{ll} D = \frac{15 \times 25}{50 \times 22} & ④ \\ H = \frac{12 \times 33}{121} & ⑧ \end{array} \quad \begin{array}{ll} C = \frac{20}{14} & ③ \\ G = \frac{22}{16} & ⑦ \end{array} \quad \begin{array}{ll} B = \frac{32}{24} & ② \\ F = \frac{91}{143} & ⑥ \end{array} \quad \begin{array}{ll} A = \frac{24 \times 18}{60} & ① \\ E = \frac{14 \times 18}{56} & ⑤ \end{array}$$

العبارات الجبرية ٢

خاصّة أساسية. أيًّا كانت الأعداد a و b و c كان $a(b + c) = ab + ac$.



نشر عبارة من الصيغة $a(b + c)$ هو تحويلها إلى مجموع الحدين ab و ac . فمثلاً :

$$x(2x + 1) = 2x^2 + x$$

$$(x + 1)(3 - x) = 3x + 3 - x^2 - x = -x^2 + 2x + 3$$

أمّا **تحليل** العبارة $ab + ac$ إلى عوامل فهو الانتقال إلى الصيغة $a(b + c)$. فمثلاً :

$$\begin{aligned} A(x) &= \underbrace{(x - 1)}_a \underbrace{(2 - x)}_b + \underbrace{(x - 1)}_a \underbrace{(2x + 1)}_c \\ &= \underbrace{(x - 1)}_a \underbrace{\left((2 - x) + (2x + 1) \right)}_{(b+c)} \\ &= (x - 1)(x + 3) \end{aligned}$$



تقيد مهارتا النشر والتحليل في تبسيط بعض الصيغ، وحل المعادلات، وتعيين إشارة بعض المقادير كما سنرى.

متطابقات شهيرة



تقيد المتطابقات الشهيرة في نشر العبارات أو تحليلها إلى عوامل، وأهمُّها هي المتطابقات من **الدرجة الثانية** الآتية :

أيًّا كان العددان a و b كان

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$



لنشر المقدار $(2x + 3y)^2$. إنَّ لهذا المقدار الصيغة $(a + b)^2$ إذ تؤدي $2x$ دور a ، وتؤدي $3y$ دور b .

$$(2x + 3y)^2 = (2x)^2 + 2(2x)(3y) + (3y)^2 = 4x^2 + 12xy + 9y^2$$

وكذاك نستعمل المتطابقات الشهيرة في التحليل إلى عوامل كما في المثال الآتي :

مثال

لتحلّل المقدار . نكتب $A = (x^2 + 2x + 1) - 3(x + 1)$

$$\begin{aligned} A &= (x^2 + 2x + 1) - 3(x + 1) \\ &= (x + 1)^2 - 3(x + 1) \\ &= (x + 1)(x + 1 - 3) = (x + 1)(x - 2) \end{aligned}$$



① حلّ العباره الآتية إلى جداء عوامل بسيطة:

$$A = (x + 1)(2x + 3) - (x + 1)(-x + 2) + 5(x + 1)^2$$

عند تحليل عباره مكونه من مجموع حدود، يمكن البدء بالبحث عن عامل مشترك بينها جميعاً.



② اخترلُ ، في حالة $x \neq -\frac{4}{3}$ ، العباره التالية بعد أن تحلّل البسط

③ أثبت أنّ $B = (\sqrt{2} + \sqrt{6})^2 - 5$ يكتب بالشكل $a\sqrt{3} + b$ حيث a و b عدوان صحيحان.

④ أثبت أنّ $B = (3\sqrt{2} - \sqrt{3})^2 + (3\sqrt{2} + \sqrt{3})^2$ عدد طبيعي.

⑤ أثبت صحة المتطابقات التكعيبية الآتية :

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

يسمح لمن يحفظ هذه المتطابقات التكعيبية أن يستعملها في حل التمارينات.



⑥ أثبت أنّ العدد $a = \sqrt{11 + 6\sqrt{2}} + \sqrt{11 - 6\sqrt{2}}$ عدد صحيح وعینه.

المعادلات الجبرية 3

لنتأمل العبارات الجبرية :

$$A = 2x + 5$$

$$B = (2x + 4)(x - 6)$$

$$C = x^2 + y^2$$

$$D = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$$

نسمّي كلاً من الصيغ $A = 0$ أو $B = 0$ أو $C = 0$ أو $D = 0$ ما يُماثلها مُعادلة جبرية، ونسّمي المتغيرات x و y و ... مجاهيل هذه المعادلات. وحلُّ أيٌّ منها ضمن مجموعة مُعطاة هو البحث في هذه المجموعة عن قيم متغيرات المُعادلة.

فكمَا تعلم، للمُعادلة $A = 0$ حلٌّ وحيدٌ في \mathbb{R} هو $x = -\frac{5}{2}$ ، ولكن ليس لها حلول في \mathbb{Z} . وللمُعادلة $x = 0$ حلان في \mathbb{R} فقط هما $x = 6$ أو $x = -2$. وللمُعادلة $C = 0$ حلٌّ وحيد هو $y = 0$.

نقول إنَّ **المعادلتين $E = 0$ و $F = 0$ متكافئتان** إذا كانت لهما الحلول نفسها. وتقوم الطريقة العامة في حلِّ مُعادلة من الصيغة $E = 0$ على تطبيق تحويلات بسيطة متالية عليها لإرجاعها إلى مُعادلة مُكافئة لها تكون أسهل حلًا. وفيما يلي بعض هذه القواعد :

- ➊ عندما نجمع العدد نفسه إلى طرفي مُعادلة $E = 0$ أو نطرحه من طرفيها، نحصل على مُعادلة جديدة مُكافئة لها، أي لها حلول المُعادلة $E = 0$ نفسها.
- ➋ عندما نضرب بالعدد غير المعدوم نفسه طرفي مُعادلة، أو نقسم طرفيها عليه، نحصل على مُعادلة جديدة مُكافئة لها.
- ➌ إذا كانت A و B عبارتين جبريتين. فإنَّ المُعادلة $AB = 0$ تُكافئ $A = 0$ أو $B = 0$. ويمكن تعميم هذه الخاصَّة إلى جداء ضرب ثلاثة عبارات أو أكثر.



لحل المُعادلة $(x - 5)(x + 11) = 0$ نبدأ بحل كلٌّ من المُعادلتين $x - 5 = 0$ و $x + 11 = 0$. تقبل الأولى العدد 5 حلًا وحيدًا، وتقبل الثانية العدد -11 حلًا وحيدًا. إذن العددان الحقيقيان 5 و -11 هما حلان المُعادلة $(x - 5)(x + 11) = 0$ أو جذراها. ومجموعة الحلول هي $S = \{5, -11\}$.

لحل المعادلة $x^3 - 5x^2 + 6x = 0$ نبدأ بـ ملاحظة أنَّ

$$\begin{aligned} x^3 - 5x^2 + 6x &= x(x^2 - 5x + 6) \\ &= x(x - 2)(x - 3) \end{aligned}$$

إذن يكون x حلًّا للمعادلة $x^3 - 5x^2 + 6x = 0$ إذا وفقط إذا كان x حلًّا لإحدى المعادلات $x = 0$ أو $x - 3 = 0$ أو $x - 2 = 0$. فمجموعـة حلول المعادلة $x^3 - 5x^2 + 6x = 0$ هي $\{0, 2, 3\}$.

ليكن c عدداً حقيقياً موجباً تماماً. لحل المعادلة $x^2 - c = 0$ نستفيد من المتطابقة الشهيرة

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

ونتذكّر أنَّ $x^2 - c = 0$ ، $x^2 - (\sqrt{c})^2 = (x + \sqrt{c})(x - \sqrt{c})$ فنكتب $c = (\sqrt{c})^2$ تُكافئ $(x + \sqrt{c})(x - \sqrt{c}) = 0$


وحلول هذه الأخيرة هي \sqrt{c} أو $-\sqrt{c}$ ، فمجموعـة حلول المعادلة $x^2 = c$ هي $\{-\sqrt{c}, \sqrt{c}\}$.

حل المعادلات الآتية : ①

$$\begin{array}{ll} (x + 5)^2 = 5 & ② \quad (x - 1)^2 = 16 \quad ① \\ (x - 1)^2 - 2(x - 1) + 1 = 0 & ④ \quad (2 - x)^2 = 2 \quad ③ \\ 3(x + 1) - (x + 1)^2 = 0 & ⑥ \quad (2 - x)(x - 1)(4x - 5) = 0 \quad ⑤ \end{array}$$

② أثبت أنَّ $\sqrt{2} + 1$ هو حلًّا للمعادلة $x^2 - 2x - 1 = 0$ ، هل هناك حلًّ آخر ؟

③ أثبت أنَّ $\frac{\sqrt{5} + 1}{2}$ هو حلًّا للمعادلة $x^2 = 1 + x$ ، هل هناك حلًّ آخر ؟



يُسمى العدد $\Phi = \frac{\sqrt{5} + 1}{2}$ العدد الذهبي.

في الشكل المجاور، ABC مثـث متـساـوي السـاقـين، والمـثـثان CDB و ABC و BCA مـتشـابـهـان، و $[CD]$ منـصـف لـزاـوية $\angle BCA$ ، و $BC = 1$. تـيقـنـ أنَّ $\Phi = AC$.

التّرتيب في مجموعة الأعداد الحقيقية

قولنا إنَّ العدد x عددٌ حقيقيٌ موجبٌ تماماً يعني أنَّ x أكبرٌ من الصفر ولا يساويه. فالكتابة $x > 0$ ، تُقرأ « x موجبٌ تماماً»، أما الكتابة $x \geq 0$ فتعني أنَّ x عددٌ موجبٌ تماماً أو صفر.

وفيما يأتي عندما نقول إنَّ x عددٌ موجبٌ فهذا يعني أنَّ $x \geq 0$.

تُقرأ الكتابة $x > \sqrt{5}$: « x أكبرٌ تماماً من $\sqrt{5}$ » ، وتنُقرأ الكتابة $x \leq 2$: « x أصغرٌ من العدد 2» وهي تعني أنَّ x أصغرٌ تماماً من 2 أو تساوي 2.

وتعني الكتابة $-\frac{4}{3} \leq x \leq -1$ أنَّ $-1 \leq x \leq -\frac{4}{3}$ في آنٍ معاً.

تعني **مقارنة** عدد حقيقي a بآخر b معرفة أيهما أكبر، أو هل هما متساويان. أمّا الخاصّة الأساسية لإجراء هذه المقارنة فهي الآتية :

خاصّة أساسية. يكون $a > b$ إذا وفقط إذا كان $0 > a - b$. وبذلؤال المقارنة بين a و b إلى دراسة إشارة الفرق $a - b$.



لمقارنة العددين $a = \sqrt{2}$ و $b = \frac{7}{5}$. حسب الفرق كما يلي :

$$\begin{aligned} a - b &= \sqrt{2} - \frac{7}{5} = \frac{5\sqrt{2} - 7}{5} \\ &= \frac{5\sqrt{2} - 7}{5} \times \frac{5\sqrt{2} + 7}{5\sqrt{2} + 7} \\ &= \frac{(5\sqrt{2})^2 - 7^2}{5(5\sqrt{2} + 7)} \\ &= \frac{50 - 49}{5(5\sqrt{2} + 7)} = \frac{1}{5(5\sqrt{2} + 7)} > 0 \end{aligned}$$

تذكر المتطابقة الشهيرة
 $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$

إذن $0 > a - b$ أي $a > b$.

خاصّة أساسية. إذا كان a عدداً حقيقياً كان $a^2 \geq 0$.

ليكن x عدداً موجباً تماماً. لمقارنة العددان $a = x + \frac{1}{x}$ و $b = 2$. نحسب الفرق كما يأتي :

$$\begin{aligned} a - b &= x + \frac{1}{x} - 2 = \frac{x^2 - 2x + 1}{x} \\ &= \frac{(x-1)^2}{x} \geq 0 \end{aligned}$$

إذن $x + \frac{1}{x} \geq 2$ أو $a \geq b$ ومنه $a - b \geq 0$

المتراجعات والعمليّات

ندرس فيما يأتي متراجعات تامة، أي من النمط $b < a$ ، وتبقى جميع الخواص المدرosa صحيحة في حالة المتراجعات $a \leq b$.

١ الترتيب والجمع

إذا كان $a < b$ فإن $a + c < b + c$ و $a - c < b - c$

أي إذا أضفنا إلى طرفي متراجحة العدد نفسه، أو طرحنا من طرفيها العدد نفسه، لا يتغيّر اتجاهها.

ونتيجة لذلك نحصل على **قاعدة النقل من طرف إلى آخر**: إذا كان $x + a < b$ كان $x < b - a$ إذ يكفي أن نضيف إلى طرفي المتراجحة الأولى العدد $-a$.

وكذلك لدينا الخاصة التالية :

إذا كان $a < b$ و $c < d$ فإن $a + c < b + d$

أي إذا جمعنا طرفاً إلى طرف متراجحتين لهما الاتجاه نفسه فإننا نحصل على متراجحة لها الاتجاه نفسه.

٢ الترتيب والضرب

◆ إذا كان $\frac{a}{c} < \frac{b}{c}$ و $ac < bc$ وكان $c > 0$

◆ إذا كان $\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$ و $ac > bc$ وكان $c < 0$

ونعبر عن ذلك بالقول :

- إذا ضرب طرفا متراجحة بعدد موجب تماماً، أو قسم طرفاها على عدد موجب تماماً، لا يتغير اتجاهها.
- إذا ضرب طرفا متراجحة بعدد سالب تماماً، أو قسم طرفاها على عدد سالب تماماً، تغير اتجاهها.

وكذلك لدينا الخاصة التالية :

إذا كانت a, b, c, d أعداداً حقيقة موجبة وكان $b < a$ و $d < c$ كان $ac < bd$

أي إذا ضربنا طرفاً بطرف متراجحتين تربطان أعداداً موجبة ولهمما الاتجاه نفسه حصلنا على متراجحة لها الاتجاه نفسه.

مثال

① ليكن x و y عددين حقيقيين يحققان $3 \leq x \leq 2$ و $2 \leq y \leq 1$ ، عين عددين حقيقيين يحصاران المقدار $A = xy$ بينهما.

② ليكن x عدداً حقيقياً يحقق $2 < x < -1$ ، عين عددين يحصاران المقدار $B = -2x - 3$ بينهما.

الحل

① استناداً إلى الفرض لدينا $3 \leq x \leq 2$ و $2 \leq y \leq 1$. نريد ضرب هذه المتراجحتات طرفاً بطرف، ولكي نفعل ذلك ارتکاب خطأ علينا التوثق أن جميع الأعداد المذكورة موجبة. وهذا أمر واضح هنا إذن : $2 \times 3 \leq xy \leq 2 \times 1$ أي $6 \leq A \leq 2$.

② نبدأ بحصر المقدار $-2x - 3$ - ثم المقدار $-2x$ - لحصر المقدار $-2x$ - نضرب أطراف المتراجحة $-1 < x < 2$ - بالعدد 2 - متبعين أنه سالب وأن اتجاه المتراجحة سيتغير، فنجد $2 < -2x < 4$. ثم إذا جمعنا العدد 3 - إلى أطراف المتراجحة السابقة وجدنا $3 < -2x - 3 < 2 - 3 = -1$ ، وعليه تكون قد أثبتنا أن $-7 < B < -1$.

③ الترتيب وعلاقته بحساب مربع عدد أو جذر التربيع أو مقلوبه

ليكن a و b عددين موجبين، عندئذ يكون $a^2 < b^2$ إذا وفقط إذا كان $a < b$

في حالة عددين موجبين a و b يكون المجموع $a + b$ موجباً، ومن ثم ينتج من المساواة :

$$b^2 - a^2 = \underbrace{(b + a)}_{\text{موجب}}(b - a)$$



أن المقدارين $a^2 - b^2$ و $b - a$ الإشارة نفسها. فإذا كان أحدهما موجباً تماماً كان الآخر موجباً تماماً.



هل تبقى النتيجة السابقة صحيحة إذا لم نفترض العددين a و b موجبين؟

وتنتهي الخاتمة الآتية من السابقة:

ليكن a و b عددين موجبين، عندئذ يكون $\sqrt{a} < \sqrt{b}$ إذا وفقط إذا كان $a < b$.

لأنه استناداً إلى ما سبق يكون $\sqrt{b} < \sqrt{a}$ إذا وفقط إذا كان $b < a$.



تدرب

أثبت صحة كل من المتراجحتين : $\frac{41}{29} < \sqrt{2}$ و $\sqrt{2} < \frac{17}{12}$

وكذلك لدينا الخاصة المهمة الآتية :

ليكن a و b عددين موجبين تماماً. عندئذ يكون $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ إذا وفقط إذا كان $b < a$.

لماذا؟



ليكن x عدداً حقيقياً يحقق $5 < x < 2$. احصر المقدار $A = x + \frac{1}{x}$ بين عددين موجبين. أي عين عددين موجبين a و b (لا يتعلقان بقيمة x) يتحققان $a < A < b$.



إن $x < 2$ تقتضي $\frac{1}{x} > \frac{1}{2}$ ، ولأن $0 > x > 5$ فإن x تقتضي $\frac{1}{5} < \frac{1}{x} < \frac{1}{2}$. إذن

$$\frac{1}{5} < \frac{1}{x} < \frac{1}{2}$$

نجمع إلى المتراجحة السابقة المتراجحة $5 < x < 2$ طرفاً إلى طرف فنجد :

$$2 + \frac{1}{5} < x + \frac{1}{x} < 5 + \frac{1}{2}$$

$$\cdot \frac{11}{5} < A < \frac{11}{2} \quad \text{أي}$$

① بين الإجابات الصحيحة من بين الإجابات الثلاث المقترحة فيما يأتي :

♣ إذا كان $x \leq -3$ كان :

$$\cdot x - 1 \leq 4 \quad ③$$

$$x - 1 \leq -4 \quad ②$$

$$x - 1 < -2 \quad ①$$

♣ إذا كان $x > 2$ كان :

$$\cdot -\frac{2}{3}x > 3 \quad ③$$

$$-\frac{2}{3}x < 2 - \frac{2}{3} \quad ②$$

$$-\frac{2}{3}x < -\frac{4}{3} \quad ①$$

♣ إذا كان $0 \leq a \leq 1$ كان :

$$\cdot a \leq a^2 \quad ③$$

$$a^2 \leq 1 \quad ②$$

$$a \geq a^2 \quad ①$$

♣ إذا كان $0 < a < 3$ كان :

$$\cdot \frac{1}{a} > \frac{1}{3} \quad ③$$

$$\frac{1}{a} \leq \frac{1}{3} \quad ②$$

$$\frac{1}{a} < \frac{1}{3} \quad ①$$

♣ إذا كان $\frac{1}{2} < a < 2$ كان :

$$\cdot \frac{1}{\sqrt{2}} < \sqrt{a} < \sqrt{2} \quad ③$$

$$\frac{1}{4} < \frac{1}{a^2} < 4 \quad ②$$

$$\frac{1}{2} < \frac{1}{a} < 2 \quad ①$$

♣ إذا كان $\frac{1}{6} < y < \frac{1}{2}$ و $\frac{1}{3} < x < \frac{3}{4}$ كان :

$$\cdot 18 < \frac{1}{xy} < \frac{8}{3} \quad ③$$

$$\frac{1}{18} < xy < \frac{3}{8} \quad ②$$

$$\frac{1}{2} < x + y < \frac{5}{4} \quad ①$$

قارن بين العددين a و b في الحالات التالية : ②

$$a = \sqrt{5}\sqrt{7}, b = 6 \quad ② \quad .a = 5, b = 2\sqrt{6} \quad ①$$

$$.a = \frac{1}{\sqrt{2}}, b = \frac{7}{10} \quad ④ \quad .a = 8, b = 3\sqrt{7} \quad ③$$

$$.a = 135 \times 10^{-25}, b = 2.1 \times 10^{-23} \quad ⑥ \quad .a = \frac{9.01}{10^{53}}, b = \frac{90.11}{10^{54}} \quad ⑤$$

③ في كل مما يلي، احصى المقدار A بين عددين، إذا علمت أن a تحقق الشرط المُعطى :

$$.\frac{1}{4} < a < \frac{1}{2}, \quad A = \frac{1}{a} - 2 \quad ② \quad .\frac{1}{2} \leq a \leq \frac{3}{2}, \quad A = a^2 + 3 \quad ①$$

$$.1 \leq a \leq 2, \quad A = (a - 1)^2 - 3 \quad ④ \quad .5 < a < 9, \quad A = \sqrt{a} + 2 \quad ③$$

$$.8 < a < 15, \quad A = \sqrt{a + 1} - 1 \quad ⑥ \quad .6 < a < 11, \quad A = \sqrt{a - 2} \quad ⑤$$

④ ما إشارة كل من العددين $9 - 4\sqrt{5}$ و $\frac{1}{2\sqrt{2} - 3}$ ؟

المجالات في مجموعة الأعداد الحقيقية



ليكن a و b عددين حقيقيين يتحققان المترابحة $b < a$. يُبيّن الجدول التالي مختلف أنماط المجالات :


	وتمثيلها على مستقيم مدرج هو كما يأتي :	هو مجموعة الأعداد الحقيقة x التي تحقق المترابحة	المجال الذي نرمز إليه بالرمز
مجالات مغلقة		$a \leq x \leq b$	$[a, b]$
		$a < x \leq b$	$]a, b[$
		$a < x \leq b$	$]a, b]$
		$a \leq x < b$	$[a, b[$
مجالات غير محدودة		$a \leq x < +\infty$	$[a, +\infty[$
		$a < x < +\infty$	$]a, +\infty[$
		$-\infty < x \leq b$	$]-\infty, b]$
		$-\infty < x < b$	$]-\infty, b[$

- يقرأ الرمز $+\infty$ «زائد لانهاية»، ويقرأ الرمز $-\infty$ «ناقص لانهاية». إضافة إلى المجالات التي عرفناها، هناك المجال $[-\infty, +\infty]$ الذي يمثل مجموعة الأعداد الحقيقية \mathbb{R} .

- تسمى المجالات من النمط $[a, b]$ مجالات مغلقة ومحدودة.

- لتأمل عددين حقيقيين a و b يتحققان $b < a$ ، ولتكن I واحداً من المجالات $[a, b]$ و $[a, b[$ و $]a, b]$ و $]a, b[$. عندئذ نسمى العددين a و b طرفي المجال I . ونسمي $c = \frac{a+b}{2}$ مركزه أو


منتصفه، ونسمي $r = \frac{b-a}{2}$ نصف قطره، وأخيراً نسمى $b-a$ طوله.




- نستنتج من الملاحظة السابقة أنّ نقاط المجال $[a, b]$ هي تلك النقاط التي تبعد عن مركزه مسافة أصغر، أو يساوي نصف قطره. يذكّرنا هذا بمفهوم القيمة المطلقة لعدد حقيقي التي تقيس المسافة بين العدد والمبدأ على المستقيم المدرّج، ولقد درسنا هذا المفهوم في العام الماضي.

تعريف

ليكن x عدداً حقيقياً، نسمّي القيمة المطلقة للعدد x المقدار $|x|$ الذي يساوي x في حالة $x \geq 0$ ويساوي $-x$ في حالة $x < 0$.



يقيس العدد $|x|$ المسافة بين النقطة M التي فاصلتها x على المستقيم المدرّج والمبدأ O .



وبوجه عام يمثّل المقدار $|x - y|$ المسافة بين النقطة M التي فاصلتها x والنقطة N التي فاصلتها y .

تذكّر أنّ القيمة المطلقة $|x|$ تُحقّق الخواص الآتية :


$$(x = -a \Rightarrow x = a) \text{ أو } |x| = |a| \text{ والمساواة } |x| = |-x| \text{ و } |x| = \sqrt{x^2}$$

وهي تُحقّق أيضاً المتراجحة المهمة التالية :

$$|x + y| \leq |x| + |y| \text{ أيًّا كان العددان } x \text{ و } y \text{ كان}$$

- لرجوع الآن إلى المجالات، تنتهي x إلى المجال **المغلق** $[a, b]$ إذا وفقط إذا كان x بُعد عن مركز المجال $c = \frac{a+b}{2}$ (نصف قطر المجال) أصغر أو يساوي $r = \frac{b-a}{2}$ (نصف قطر المجال). أي إذا تحقق الشرط $|x - c| \leq r$. نُعبر عن هذه الخاصّة رمزاً كما يلي :

$$|x - c| \leq r \text{ إذا وفقط إذا كان } x \in [c - r, c + r]$$






كيف نعبر عن الخاصّة : x لا تنتهي إلى المجال المغلق $[a, b]$.

مثال

نتأمّل المجالات $I = [-3, 5]$ و $J = [2, +\infty)$ و $I \cap J =]2, 7]$ ، عيّن كلاً من $I \cup J$ و $I \cap K$ ، وكذلك $I \cup K$ و $I \cap K$.

الحل

لنمثل بيانيًا المجالين I و J . ولنذكر أن $I \cap J$ هو **تقاطع** المجالين I و J . أي مجموعة الأعداد الحقيقية التي تنتهي إلى هذين المجالين في آنٍ معاً، فهي إذن الأعداد التي تنتهي إلى المجال $[2, 5]$.



أمّا $I \cup J$ فهو **اجتماع** المجالين I و J . أي مجموعة الأعداد الحقيقية التي تنتهي إلى أحد هذين المجالين أو إلى كليهما، فهي إذن الأعداد التي تقع في المجال $[-3, 7]$.

بالمثل، نلاحظ من جهة ثانية، أن لا عناصر مشتركة بين المجالين I و K ، إذن $I \cap K = \emptyset$ ، حيث يقرأ الرمز \emptyset «المجموعة الخالية». أمّا $I \cup K$ فهي المجموعة $[6, +\infty) \cup [-3, 5]$ وهي ليست مجالاً



① مثل على مستقيم مدرج مجموعة الأعداد الحقيقية التي تتحقّق الشرط المعطى، في كلٌّ من الحالات الآتية :

$$\left| x - 1 \right| \geq 2 \quad ④ \quad |x| > 0 \quad ③ \quad \left| x - \frac{3}{2} \right| < 1 \quad ② \quad |x - 2| \leq 3 \quad ①$$

② عيّن، في حال وجودها، قيم x التي تتحقّق الشرط المبيّن في كلٌّ من الحالات الآتية :

$$\begin{array}{ll} \left| x + 5 \right| = 10^{-2} & ② \\ \left| x - 8 \right| = |x + 5| & ④ \\ \left| x + 2 \right| = 3|x - 6| & ⑥ \end{array} \quad \begin{array}{ll} \left| x - 3 \right| = 2 & ① \\ \left| x - 3 \right| = |2 - x| & ③ \\ \left| x - 5 \right| = |x + 5| & ⑤ \end{array}$$

③ عبّرْ باستعمال القيمة المطلقة عن قيم x التي تتحقّق الشرط المبيّن في كلٌّ من الحالات الآتية :

$$\begin{array}{lll} x \in [-8, -4] & ③ & x \in]3, 11[& ② & x \in [2, 12] & ① \\ x \in]-\infty, -1] \cup [7, +\infty[& ⑥ & x \in]-\frac{3}{2}, \frac{5}{3}[& ⑤ & x \in \left[-\frac{3}{4}, \frac{1}{4} \right] & ④ \end{array}$$

المتراجحة وإشارة المقدار

ليكن a و b عددين حقيقيين. حل المتراجحة $ax + b \leq 0$ هو إيجاد كل الأعداد الحقيقية التي تجعل $ax + b$ سالباً أو معدوماً، والقيم التي نحصل عليها تسمى حلول المتراجحة.

مثال

حل المتراجحة $2x + 3 \leq 0$ هو تعريف قيم المتغير x التي تتحققها، وتسمى مجموعة هذه القيم S مجموعة حلول المتراجحة.

نكتب المتراجحة $2x + 3 \leq 0$ بالصيغة المكافئة: $-3 \leq -2x$ ، وبتقسيم طرفي المتراجحة على العدد الموجب تماماً 2 نجد $\frac{3}{2} \leq x$. فمجموعة الحلول S هي الأعداد الحقيقية التي هي أصغر أو تساوي $-\frac{3}{2}$ أي المجال $[-\infty, -\frac{3}{2}]$.

وبوجه عام يمكن تعريف قيمة x التي تجعل المقدار $ax + b$ موجباً تماماً، وذلك التي تجعله سالباً تماماً. كما يلي :

مبرهنة

ليكن العددان الحقيقيان a و b حيث $a \neq 0$ ، نجد فيما يلي إشارة $ax + b$ تبعاً لقيمة x :

		$a < 0$			$a > 0$		
		في حالة $x < -\frac{b}{a}$			في حالة $x > -\frac{b}{a}$		
x		$-\frac{b}{a}$			$-\frac{b}{a}$		
$ax + b$		+			-		

أي إن إشارة المقدار $ax + b$ تُماثل إشارة a إذا كان $\frac{-b}{a} > x$ ، وتعاكس إشارة a إذا كان $x < \frac{-b}{a}$.

في الحقيقة، إن $x = \frac{-b}{a} \neq 0$ يكافيء $ax + b = 0$ لأن $a \neq 0$ 

حالات ① $a > 0$

▪ $x > \frac{-b}{a}$ يكافيء $ax + b > 0$ ، وبالقسمة على العدد الموجب تماماً a نجد $x > -\frac{b}{a}$

▪ $x < \frac{-b}{a}$ يكافيء $ax + b < 0$ ومن ثم $x < -\frac{b}{a}$

حالات ② $a < 0$

▪ $x < \frac{-b}{a}$ يكافيء $ax + b > 0$ وبالقسمة على العدد السالب تماماً a نجد $x > -\frac{b}{a}$

▪ $x > \frac{-b}{a}$ يكافيء $ax + b < 0$ ومن ثم $x < -\frac{b}{a}$



ينعدم المقدار $ax + b$ عند $x_0 = -\frac{b}{a}$ ، وهو يحافظ على إشارة واحدة على كل مجال من المجالين $t \in]-\infty, x_0]$ و $t \in]x_0, +\infty[$. ولتعيين هذه الإشارة يكفي أن نعيّن إشارة $at + b$ عند قيمة اختيارية ما من أحد هذين المجالين.

مثال

① ادرس إشارة كل من المقدارين $3x - 4$ و $5x + 2$.

② استنتج إشارة كل من المقدارين $(4 - 3x)(5x + 2)$ وذلك تبعاً لقيم x .

الحل

x		$4/3$	
$4 - 3x$	+	0	-

① إشارة $4 - 3x$. إن $4 - 3x = 0$ عندما $x = \frac{4}{3}$ ، إذن إشارة هذا المقدار كما في الجدول المجاور.

x		$-2/5$	
$5x + 2$	-	0	+

إشارة $5x + 2$. إن $5x + 2 = 0$ عندما يكون $x = -\frac{2}{5}$ وإشارة هذا المقدار كما في الجدول المجاور.

لدراسة إشارة جداء AB أو كسر $\frac{A}{B}$ ندرس إشارة كل من A و B ثم نستفيد من قاعدة إلسارات.

x		$-2/5$	$4/3$	
$4 - 3x$	+	+	0	-
$5x + 2$	-	0	+	+
E	-	0	+	0

② إشارة E . ننظم جدولًا مشتركاً يضم إشارة كل من $4 - 3x$ و $5x + 2$. يمكننا في هذا الجدول أن نقرأ الخواص الآتية :

$\bullet x = \frac{4}{3}$ أو $x = -\frac{2}{5}$ في حالة $E = 0$ ■

$\bullet x \in \left]-\frac{2}{5}, \frac{4}{3}\right[$ أي إذا كان $-\frac{2}{5} < x < \frac{4}{3}$ $E > 0$ ■

$\bullet x \in \left]-\infty, -\frac{2}{5}\right[\cup \left]\frac{4}{3}, +\infty\right[$ أي إذا كان $x < -\frac{2}{5}$ أو $x > \frac{4}{3}$ $E < 0$ ■

ونترك لك أن تتدرب بالمثل على تعين إشارة المقدار F .

تَدْرِيْجٌ

① حل في \mathbb{R} المترابحة المُعطاة، ومثل على مستقيم مدرج مجموعة حلولها S ، واكتبه بصيغة مجال في كل من الحالات الآتية :

$$-3x + 1 \geq 2x + 4 \quad \textcircled{2} \quad 8x + 3 < 10x - 1 \quad \textcircled{1}$$

$$\sqrt{2}x - 1 > 2\sqrt{2} - 1 \quad \textcircled{4} \quad -\frac{1}{2}x - 5 \leq -4 \quad \textcircled{3}$$

② ادرس إشارة المقدار $A(x)$ تبعاً لقيمة x في كل من الحالات الآتية :

$$A(x) = 2x - 4 \quad \textcircled{2} \quad A(x) = -3x + 5 \quad \textcircled{1}$$

$$(x \neq 2) : \quad A(x) = \frac{-3x + 9}{4x - 8} \quad \textcircled{4} \quad A(x) = (x + 1)(-2x + 6) \quad \textcircled{3}$$

$$A(x) = -(x - 3)^2 \quad \textcircled{6} \quad A(x) = |2x - 3| \quad \textcircled{5}$$



مِنِّيَّاتٍ وَمُسَائِلٍ



العددان $B = \sqrt{6}$ و $A = \sqrt{2} - \sqrt{6}$ هما عددان غير عاديين. بين: أي الأعداد التالية عادي؟

1

$$\cdot B^2 \quad \textcircled{3} \qquad \cdot 5 - A^2 \quad \textcircled{2} \qquad \cdot A^2 + B \quad \textcircled{1}$$

تُوْثِّق أَنَّ العددين التاليين عددان عاديان :

2

$$\cdot \sqrt{1 + \frac{5}{13}} \times \sqrt{1 - \frac{5}{13}} \quad \textcircled{2} \qquad \cdot \sqrt{1 + \frac{3}{5}} \times \sqrt{1 - \frac{3}{5}} \quad \textcircled{1}$$

تُوْثِّق أَنَّ العددين التاليين عددان عاديان :

3

$$\cdot \left(\sqrt{\frac{4}{3}} + \sqrt{\frac{3}{4}} \right)^2 \quad \textcircled{2} \qquad \cdot \left(\sqrt{\frac{5}{2}} - \sqrt{\frac{2}{5}} \right)^2 \quad \textcircled{1}$$

وبَيْنَ بُوْجَهِ عَامِ، أَنَّ إِذَا كَانَ a عَدْدًا عادِيًّا كَانَ الْعَدْدَانُ الْآتَيَانُ عَدَدِيَّانِ عادِيَّانِ :

$$\cdot \left(\sqrt{a} + \sqrt{\frac{1}{a}} \right)^2 \quad \text{وَ} \quad \left(\sqrt{a} - \sqrt{\frac{1}{a}} \right)^2$$

حلَّ كُلَّاً مِنَ الْعَبَارَاتِ الْآتَيَةِ إِلَى جَداءِ ضَرْبِ عَوْمَلَيْ بَسيِطَةٍ :

4

$$B = \frac{x^2 - 9}{5} - \frac{x + 3}{2} \quad \textcircled{2} \qquad A = 9(4x^2 - 4x + 1) + 2(2x - 1) \quad \textcircled{1}$$

$$D = x^3 + x^2 + x + 1 \quad \textcircled{4} \qquad C = (x + 1)(8x - 4) - (2x - 1)^2 \quad \textcircled{3}$$

حلَّ فِي \mathbb{R} كُلَّاً مِنَ الْمُعَادِلَاتِ الْآتَيَةِ :

5

$$x(3x - 2) = 4 - 9x^2 \quad \textcircled{2} \qquad 9x^2 - 1 = 3x + 1 \quad \textcircled{1}$$

$$\frac{x^2}{x - 1} = 4 \quad \textcircled{4} \qquad \frac{4}{x - 1} = x - 1 \quad \textcircled{3}$$

اكتب المقدار الآتي بأبسط صيغة :

6

$$\frac{\sqrt{5} + \sqrt{3}}{\sqrt{5} - \sqrt{3}} + \frac{\sqrt{5} - \sqrt{3}}{\sqrt{5} + \sqrt{3}}$$

ليكن x عدداً حقيقياً يُحَقِّق $5 = x + \frac{1}{x}$ احسب بأبسط صيغة المقدار

7

$$x^3 + \frac{1}{x^3}$$

لنتعلم البحث معاً

إثبات منطقيات 8

① أثبتْ أنّه، مهما كان العدد الحقيقي x كان :

$$3x^4 - 4x^3 + 1 = (x - 1)^2(2x^2 + (x + 1)^2)$$

② أثبتْ أنّه، مهما كانت الأعداد الحقيقية a, b, c, d كان :

$$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac + bd)^2 + (ad - bc)^2$$

نحو الحل

①

﴿ فهم السؤال . لنضع $A = (x - 1)^2(2x^2 + (x + 1)^2)$ و $B = 3x^4 - 4x^3 + 1$. نريد أن نثبت أن $A = B$

. إحدى الطرق الممكنة هي نشر المقدار A واختزاله أملاً إلى B .

﴿ الحساب . انشر ثم اختصر عبارة A . يجب أن تصل إلى B .

أنجز البرهان واكتبه بلغة سليمة.

②

﴿ فهم السؤال . لنضع :

$$A = (ac + bd)^2 + (ad - bc)^2$$

$$B = (a^2 + b^2)(c^2 + d^2)$$

نريد أن نثبت أن $A = B$. يمكننا أن نتبع طريقة السؤال السابق.

﴿ الحساب . انشر ثم اختصر عبارة A . ستجد $A = a^2c^2 + a^2d^2 + b^2c^2 + b^2d^2$. ولكن بعكس

السؤال السابق لم نحصل هذه المرة على B ، وقد لا نرى كيف نحوال A أكثر من ذلك لنصل إلى B . ومنه فكرة تحويل B بنشر الجداء.

﴿ متابعة الحساب . انشر عبارة B . ماذا تجد ؟

أنجز البرهان واكتبه بلغة سليمة.

أختيارات الصيغة المناسبة 9

نعرف، أيّاً كانت x من \mathbb{R} ، المقدار : ① $E(x) = (x + 3)^2 - 25$

• أثبتْ أنّ : ② $E(x) = x^2 + 6x - 16$ ③

• أثبتْ أنّ : ④ $E(x) = (x - 2)(x + 8)$

② اخترْ من بين الصيغ الثلاث السابقة الصيغة المناسبة أكثر من غيرها لحل المعادلات الآتية :

$$\cdot E(x) = -16 \quad (c) \quad \cdot E(x) = 11 \quad (b) \quad \cdot E(x) = 0 \quad (a)$$

نحو الحلّ

يمكن اتّباع أسلوب التمرين السابق.

﴿ كي نبرهن أنّ $E(x) = x^2 + 6x - 16$ يكفي أن ننشر ثمّ نختزل المقدار $(x+3)^2 - 25$. افعل ذلك. ﴾

﴿ نريد إثبات $E(x) = (x-2)(x+8)$. بدلاً من محاولة تحليل $x^2 + 6x - 16$ إلى جداء عوامل. نرى من الأسهل أن ننشر ثمّ نختزل المقدار $(x-2)(x+8)$. ﴾

أُنجز البرهان واتّبِع بلاغة سليمة.



②

﴿ فهم السؤال. المقصود «بالصيغة المناسبة أكثر من غيرها» ، الصيغة التي تفينا بالوصول إلى الحل بأقل جهد من غيرها. ﴾

﴿ فمثلاً، الصيغة المناسبة لحل المعادلة $0 = E(x)$ هي ③ بين لماذا ؟ ثمّ اكتب الحل. ﴾

﴿ اختر الصيغة المناسبة لحل المعادلين الآخرين، برر اختيارك، ثمّ اكتب الحل. ﴾

10 استعمال الموز في الإثبات

نختار كيّفياً أربعة أعداد طبيعية متالية. نضرب أكبرها بأسغرها ونطرح من الناتج جداء ضرب العددين الآخرين، فنحصل على العدد 2. أثبت صحة هذه الخاصّة.

نحو الحلّ

﴿ فهم السؤال. لنتيقّن من فهم العمليات الموصوفة في نصّ المسوّلة، يمكننا البدء بمثال. نبدأ باختيار أربعة أعداد طبيعية متالية ولتكن 1, 2, 3, 4. جداء ضرب أكبرها بأسغرها $= 4 \times 1 = 4$ ، وجاء ضرب العددين الآخرين $= 2 \times 3 = 6$. وحاصل طرحهما $= 6 - 4 = 2$ ، فهو يساوي فعلاً 2. ﴾

﴿ بحثاً عن طريق. يطلب التمرين إثبات الحالة العامة : فقد جرى التأكيد على أنّا نختار كيّفياً الأعداد الأربع المتالية. يجب إذن أن نرمز إلى هذه الأعداد برموز مثل a, b, c, d ولكن الفرض الذي يشير إلى كونها متالية يتبيّن لنا أن نرمز إليها بالرموز $a, a+1, a+2, a+3$. توثّق أنّ إثبات المطلوب يؤول إلى إثبات :

$$a(a+3) - (a+1)(a+2) = -2$$

أثبت ذلك ثمّ صُنِع الحلّ بلاغة سليمة.



11 المتراجمات وإشارة جداً

حلّ في \mathbb{R} المتراجحة : $(\mathcal{E}) : (2x+3)^2 \leq (x-1)^2$

نحو الحل

❖ **فهم السؤال.** نهدف إلى إيجاد الأعداد x التي تتحقق $(x - 1)^2 \leq (2x + 3)^2$. نعرف كيف ندرس المتراجحات من الدرجة الأولى، أي من النمط $ax + b \leq 0$. تأتينا إذن الفكرة بإرجاع السؤال إلى تلك الحالة.

❖ **بحثاً عن طريق.** نعلم أنَّ المتراجحة $b \geq a$ تكافئ $b - a \geq 0$. وعليه تكتب المتراجحة المعطاة .
$$P(x) = (x - 1)^2 - (2x + 3)^2 \geq 0 \quad \text{حيث } P(x) \geq 0$$

- أول ما يراودنا هو نشر عبارة $P(x)$ ، وهذا ما يقودنا إلى حلَّ المتراجحة الآتية:
$$-3x^2 - 14x - 8 \geq 0$$
، ولكن لم نتعلم بعد دراسة مثل هذه المتراجحات.
- نبحث إذن عن صيغة أخرى للمقدار $P(x)$. نلاحظ أنَّ $P(x)$ هو فرق مربعين. حلُّ $P(x) \geq 0$ مستقidiًّا من هذه الملاحظة، ثمْ حلُّ المتراجحة 0 .

أثبتْ ذلك ثمْ صُنِعَ الحل بلغة سليمة.

المراجحات وإشاراتكس 12

$$\text{حل في } \mathbb{R} \text{ المتراجحة : } \frac{4x + 1}{6 - x} \leq -1$$

نحو الحل

❖ **فهم السؤال.** ليست هذه المتراجحة معرفة إلا في حالة $x \neq 6$. كما نلاحظ أنها ليست من الدرجة الأولى، لذلك علينا إرجاع دراستها إلى مثل هذه الحالة.

❖ **بحثاً عن طريق.**


- **تبسي:** لا تكتب أنَّ المتراجحة $\frac{4x + 1}{6 - x} \leq -1$ تقضي $(4x + 1) \leq -1 \times (6 - x)$ لأنَّ هذا يعود إلى ضرب طرفي المتراجحة بالمقدار $x - 6$ الذي قد يكون سالبًا.
- أثبتْ أنه في حالة $x \neq 6$ ، يمكننا كتابة المتراجحة المدروسة بالشكل المكافئ
$$\frac{3x + 7}{6 - x} \leq 0$$
، أو $\frac{4x + 1}{6 - x} + 1 \leq 0$
- علينا إذن دراسة متراجحة من النمط $0 \leq \frac{A}{B}$ في حالة $A = 3x + 7$ و $B = 6 - x$. يكفي في مثل هذه الحالة أن ندرس إشارة كلٌّ من A و B . افعل ذلك.
- نظم نتائجك في جدول واحد، واستنتج المجموعة S مجموعة حلول المتراجحة المدروسة.

أثبتْ ذلك ثمْ صُنِعَ الحل بلغة سليمة.


لتكن a و b و c و d أربعة أعداد حقيقة تحقق $b \neq 0$ و $d \neq 0$ و $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$

➊ نفترض أن $b + d \neq 0$ أثبت أن $\frac{a}{b} = \frac{c+a}{d+b}$


➋ نفترض أن $d - b \neq 0$ أثبت أن $\frac{a}{b} = \frac{c-a}{d-b}$



نفترض أن $ABCD$ مربع و $A'B'C'D'$ مستطيل. و نفترض أن مساحة الجزء الملون تساوي 183 متراً مربعاً. فإذا علمت أن AA' يساوي 5 و أن CC' يساوي 8 m، احسب AB .



نفترض أن $ABCD$ مربع. ونفترض أن مساحة المربع $EFGD$ تساوي أربع مرات مساحة المربع $ABCD$. فإذا علمت أن AE يساوي 5 m، احسب AB .



يتتألف الشكل المجاور من مربع طول ضلعه x وأربع أرباع دوائر تقع مراكزها على رؤوس المربع. عبر بدلالة x عن مساحة السطح الملون. وأعط قيمة تقريرية لهذه المساحة عندما $x = 2$.



انطلاقاً من صفيحة مستطيلة $ABCD$ ، عرضها $AB = \ell$ وطولها $AD = 2\ell$ ، نصطنع سطحين أسطوانين بطريقتين:

➊ نجعل الصلع $[BC]$ ينطبق على $[AD]$.

➋ نجعل الصلع $[AB]$ ينطبق على $[DC]$.

نرمز بالرمز V_1 إلى حجم الأسطوانة التي نحصل عليها بالطريقة الأولى، وبالرمز V_2 إلى

حجم الأسطوانة التي نحصل عليها بالطريقة الثانية. احسب النسبة $\frac{V_1}{V_2}$.

18 مقارنة عددين.

➊ a و b عدادان موجبان تماماً. قارن بين العددين

$$B = \frac{2ab}{a+b} \quad \text{و} \quad A = \frac{a+b}{2}$$

➋ a و b عدادان موجبان. قارن بين العددين

$$B = 2\sqrt{ab} \quad \text{و} \quad A = a + b$$

19

ليكن a و b عددين موجبين تماماً. أثبت أن $\frac{1}{a+b} < \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$

20

ليكن a و b عددين موجبين تماماً. أثبت أن $\sqrt{a+b} < \sqrt{a} + \sqrt{b}$

21

ليكن a و b عددين حقيقيين يتحققان $0 < b \leq a$. قارن بين الأعداد الآتية :

$$\frac{a}{b+1}, \frac{a+1}{b+1}, \frac{a}{b}$$

22

احصر المقدار A بين عددين، إذا علمت أن a تتحقق الشرط المبين في كل مما يأتي

$$\frac{1}{4} < a < \frac{1}{2}, \quad A = \frac{1}{a} - 2 \quad \textcircled{2} \quad \frac{1}{2} \leq a \leq \frac{3}{2}, \quad A = a^2 + 3 \quad \textcircled{1}$$

$$.1 \leq a \leq 2, \quad A = (a-1)^2 - 3 \quad \textcircled{4} \quad .5 < a < 9, \quad A = \sqrt{a} + 2 \quad \textcircled{3}$$

$$.8 < a < 15, \quad A = \sqrt{a+1} - 1 \quad \textcircled{6} \quad .6 < a < 11, \quad A = \sqrt{a-2} \quad \textcircled{5}$$

23

في كل من الحالات الآتية، حل المتراجحة المعطاة، ثم مثل مجموعة الحلول على مستقيم

مدرج، وعبر عنها بدالة مجالات :

$$\cdot \frac{1}{6} - \frac{x}{3} \geq \frac{1}{2} - \frac{x}{2} \quad \textcircled{2} \quad .3 - 2x \leq 5x - 1 \quad \textcircled{1}$$

$$.5 + \frac{2}{3}x > \frac{1}{6}x - 1 \quad \textcircled{4} \quad \frac{3+x}{4} \leq \frac{x-1}{2} \quad \textcircled{3}$$

$$.(7-3x)(x+4) \geq 0 \quad \textcircled{6} \quad .(2x+1)(-5x+2) < 0 \quad \textcircled{5}$$

$$.(2x+3)^2 - 4 \leq 0 \quad \textcircled{8} \quad x^2 + 3x > 0 \quad \textcircled{7}$$

$$.(x-2)^2 - (2x+3)^2 \geq 0 \quad \textcircled{10} \quad .(5x-7)^2 + 3(7-5x) \leq 0 \quad \textcircled{9}$$

24

في كل من الحالات الآتية، بين قيم x الممنوعة، ثم حل المتراجحة المعطاة، ومثل مجموعة

الحلول على مستقيم مدرج، وعبر عنها بدالة مجالات :

$$\cdot \frac{3x+7}{3x+5} \leq 0 \quad \textcircled{4} \quad \cdot \frac{2-3x}{3-2x} \leq 0 \quad \textcircled{3} \quad \cdot \frac{2+5x}{x-1} > 0 \quad \textcircled{2} \quad \cdot \frac{8-2x}{x+5} \geq 0 \quad \textcircled{1}$$

$$\cdot \frac{x^2+1}{x^2-4} \leq 1 \quad \textcircled{8} \quad \cdot \frac{x^2+1}{x^2-4} \leq 0 \quad \textcircled{7} \quad \cdot \frac{5}{2-6x} < 1 \quad \textcircled{6} \quad \cdot \frac{4}{x+1} \geq -3 \quad \textcircled{5}$$

2

مفهوم التابع

١ مقدمة عامة

٢ مفهوم التابع العددي

٣ الخطابي لتابع

٤ التابع المتزايد والتابع المتناقص

٥ جدول اطراط تابع

ظهر مفهوم التابع متأخراً، في تاريخ الرياضيات. فقدمياً كان الرياضيّات الإغريقي، وتبعهم الرياضيّات العرب في الفترة ما بين القرنين الثامن والثالث عشر، يستعملون جداول فلكيةً ومثلثةً لأهدافٍ عمليةٍ وحسابيةٍ بحثة.

وظهرت، مع بداية القرن الرابع عشر، مفاهيم جديدةً. حيث بدأ الإنسان ينظر إلى الرياضيات بصفتها لغة قادرة على وصف حقائق الفيزياء. هذا ما أكدّه غاليليو في دراسته عن السقوط الحرّ عام 1623.

وما جعل هذا الانتقال سهلاً هو البدء باستعمال الرموز الجبرية والحساب الرمزي الذي أطلقه فرانسوا فييت عام 1591. أتاح هذا التعامل مع عبارات تحوي أعداداً ومجاهيل. ومع هذا، فقد وجب انتظار ديكارت ونيوتون ولابيتنر في القرن السادس عشر وأويلر في القرن السابع عشر حتى نصل إلى صيغة كتابة قريبة من الحالية للعبارات والمعادلات الجبرية. وبوجه خاص، عمل ديكارت على المنحنيات الهندسية حيث ترتبط إحداثيات النقاط x و y بمعادلة جبرية.

وفي القرن الذي تلا عصر ديكارت وضع أوويلر وبرنولي الشكل النهائي لمفهوم التابع .

مفهوم التابع

مقدمة عامة



عندما تعتمد قيمة مقدار ما G على قيمة مقدار آخر x نقول إن G **تابع** للمتحول x . فمثلاً

- ما تدفعه لسيارة الأجرة، تابع للمسافة التي تقطعها راكباً السيارة.
- درجة الحرارة في أحد الأيام في مدینتك **تابعة** لساعات اليوم. مثلاً

	الساعة
درجة الحرارة	22 13
	20 18
	16 27
	14 27
	10 15
	6 10

- الاستهلاك الوسطي للأسرة من مياه الشرب **تابع** لعدد أفراد الأسرة.



■ مقدار استطالة نابض معلق شاقوليًا **تابع** للنَّقل المعلق به. ويسعى الفيزيائيون عادة إلى إيجاد علاقة تربط بين قياسات هذه المقاييس. فمثلاً : يقرنون بكل قيمة معطاة للنَّقل مقدار استطالة النَّابض التي يقيسونها.

- الضغط الجوي في مكان ما، **تابع** للارتفاع عن سطح البحر. ونقرن عادة بكل قيمة معطاة لارتفاع مكان عن سطح البحر مقدار الضغط الجوي عند ذلك المكان.



■ كثيراً ما نرى، عملياً وفي العلوم التجريبية، التوابع معرفة بخطوط بيانية. تذكر المخططات التي ترصد الاهتزازات الأرضية، أو تخطيط القلب الكهربائي المبين في الشكل المجاور، هذه جميعاً تعبّر عن تبعية مقدار فيزيائي معين للزمن.

- وفي الهندسة، مساحة الدائرة **تابع** لنصف قطرها.

■ في الرياضيات، نتجرّد عن الطبيعة الفيزيائية للظواهر المدرّسة، ونحتفظ بالفكرة الأساسية، وهي أن نقرن عدداً بعده آخر. وعليه :


لاصطناع تابع f يجب أن نقرن بكلّ عدد x من مجموعة عدديّة، عدداً نرمز إليه بالرمز $f(x)$.

وهكذا وضع علماء الرياضيات، قالباً عاماً ينطبق على جميع الحالات التي نسعى فيها لدراسة تغييرات مقدار معين يتعلّق بمقدار آخر (أو يتبعه).

لنذكر معاً في المثال التالي بعض التوابع التي مررت بها في دراستك السابقة، والتي سنعود إليها لاحقاً على نحوٍ أكثر تفصيلاً.




التابع التآلفية



ليكن a و b عددين حقيقيين. يسمى التابع الذي يقرن بكلّ عدد حقيقي x العدد $ax + b$ **تابعًا تآلفياً أو أفينياً أو تابعًا من الدرجة الأولى**. يمكننا التعبير عن ذلك بالكتابة الرمزية : $x \mapsto ax + b$. وإذا أسمينا هذا التابع f كان $f(x) = ax + b$. ونعرف من دراستنا السابقة أنَّ الخطَّ البيانيَّ لهذا التابع هو مستقيم. (الرسم المجاور يوافق حالة $a \neq 0$).

التابع التربيعي



يسمى التابع الذي يقرن بكلّ عدد حقيقي x العدد x^2 **تابعًا تربيعيًا**. يمكننا التعبير عن ذلك بالكتابة : $x \mapsto x^2$. وإذا أسمينا هذا التابع g كان $g(x) = x^2$. ونعرف من دراستنا السابقة أنَّ الخطَّ البيانيَّ لهذا التابع شكلًا مميّزاً أسميناه قطعاً مُكافئاً.

مفهوم التابع العددي (2)



ليكن D مجالاً أو اجتماع مجالات من \mathbb{R} .

- تعريف تابع f من D إلى \mathbb{R} ، هو أن نقرن بكل عدد حقيقي x من D عدداً حقيقياً وحيداً

$$\cdot y = f(x)$$

- نقول إن D **منطق التابع** f ، أو **مجموعة تعريفه**، أو نقول إن f معرف على D .

- نسمى العدد x من D **متحولاً**، وإذا كان a عدداً من D ، أسمينا $b = f(a)$ **صورة العدد**

$$\cdot \text{وفق } f$$

- ونسمى العبارة $y = f(x)$ أو $x \mapsto f(x)$ **علاقة ربط التابع**.

- إذا كان f تابعاً معرفاً على D كتبناه بالشكل $f : x \mapsto f(x)$ إذا لم يكن هناك مجال للبس في معرفة D ، أو كتبنا $f : D \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto f(x)$ ، وهذه الصيغة أكثر دقة.


مجموعة التَّعرِيف

غالباً ما يعطى منطق تابع ما، فنقول مثلاً إن f هو التابع المعرف على $[-4, 5]$ بالعلاقة $f(x) = x + 1$. أو يكون المنطق معروفاً من سياق المسألة المطروحة. فمثلاً للتابع f الذي يقرن بنصف قطر دائرة x مساحة هذه الدائرة أي πx^2 ، علاقة الربط $f(x) = \pi x^2$ ، واضح من سياق النص أن منطقه D هو مجموعة الأعداد الحقيقية الموجبة تماماً $[0, +\infty)$.

ولكن عندما لا نعطي مجموعة تابع معروفة علاقة ربطه، **فنصلح** أنها مجموعة الأعداد x التي يكون عندها حساب العبارة $f(x)$ ممكناً، أو يكون عندها المقدار $f(x)$ معنى.


مثال

لنفترض أن عبارة $f(x)$ كسرية، مثل $f(x) = \frac{x^2}{x - 1}$. عندئذ لا يكون حساب $f(x)$ ممكناً ما لم يكن $x - 1 \neq 0$ أو $x \neq 1$ ، لأن القسمة على العدد 0 في الأعداد الحقيقة غير ممكنة. فمجموعه تعريف f هي $D_f =]-\infty, 1[\cup]1, +\infty[$. التي نمثلها على المستقيم الحقيقي بالشكل :



مثال

لنفترض وجود جذر تربيعي في عبارة $f(x) = \sqrt{2-x}$. عندئذ لا تمثل الكتابة $\sqrt{2-x}$ عدداً حقيقياً، ما لم يكن المدار $x-2$ موجباً، أو $x \leq 2$. فمجموعه تعريف f هي $D_f =]-\infty, 2]$. التي تمثلها على المستقيم الحقيقي بالشكل:




تدريب

جد D مجموعه تعريف التابع $f : x \mapsto \frac{\sqrt{x}}{x-1}$

الحل

يؤول إيجاد D إلى إيجاد مجموعه الأعداد x التي يمكن عندها حساب $f(x)$. فالكتابه $\frac{\sqrt{x}}{x-1}$ تعني أننا نقسم الجذر التربيعي للعدد x على $x-1$. هذه الكتابه إذن لا تمثل عدداً حقيقياً إلا إذا تحقق الشرطان: $x \geq 0$ و $x \neq 1$. وعليه $D = [0, 1] \cup [1, +\infty)$.



تدريب


ليكن f التابع المعرف على \mathbb{R} وفق $f(x) = \frac{5}{x^2+1}$ عين، في حال وجودها، الأعداد التي صورة كل منها وفق f تساوي 1.



في حالة تابع f معرف على D ، إيجاد عناصر D التي صورة كل منها عدد معطى b ، هو حل المعادلة $f(x) = b$ في D .

الحل

إيجاد الأعداد الحقيقية التي صورة كل منها وفق f تساوي 1، هو إيجاد قيم x التي تتحقق $f(x) = 1$ أي $\frac{5}{x^2+1} = 1$ أو $x^2 = 4$. لهذه المعادلة جذران $x = 2$ و $x = -2$ وكلاهما مقبول لأن f معرف على كامل \mathbb{R} . فالعددان 2 و -2 هما العددان اللذان صورة كل منهما وفق f تساوي 1.



ليكن $ABCD$ مربعاً طول ضلعه يساوي 2، ننشئ على محيط المربع وخارجه أربعة مثلثات متساوية الساقين طبقة فتحصل على نجمة منتظمة، طول كلٍّ من أضلاعها يساوي x كما في الشكل المجاور، ونعرف التابع f بالقول إنَّ $f(x)$ يساوي مساحة سطح النجمة. ①

① بين أنَّ مُنطَلَقَ التابع f هو $D = [1, +\infty]$.

② اكتبُ بأسلوب صحيح عبارة التابع f .

٢) بين مجموعة تعريف كلٌّ من التابع المعرفة بالعلاقة :

$$f(x) = \frac{1}{2x} + 3x \quad ② \qquad f(x) = 2x^2 + 1 \quad ①$$

$$f(x) = \frac{1}{x-1} \quad ④ \qquad f(x) = 2x + \frac{7}{2} \quad ③$$

$$f(x) = x\sqrt{2} + 1 \quad ⑥ \qquad f(x) = 2\sqrt{x} + 1 \quad ⑤$$

$$f(x) = \frac{2x}{2x+3} \quad ⑧ \qquad f(x) = \frac{3}{x-5} \quad ⑦$$

$$f(x) = \frac{2}{x(x+1)} \quad ⑩ \qquad f(x) = \frac{1}{x^2} \quad ⑨$$

٣) بين مجموعة تعريف كلٌّ من التابع المعرفة بالعلاقة :

$$f(x) = \frac{2}{x^2 - 1} \quad ② \qquad f(x) = \frac{2}{x^2 + 1} \quad ①$$

$$f(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{x-1} \quad ④ \qquad f(x) = \frac{2}{x} + \sqrt{x+1} \quad ③$$

$$f(x) = \frac{2x}{x^2 - 2x + 1} \quad ⑥ \qquad f(x) = \frac{2}{x^2 + 4x} \quad ⑤$$

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 1} \quad ⑧ \qquad f(x) = \frac{x}{2x^2 + 1} \quad ⑦$$

$$f(x) = \frac{\sqrt{x+2}}{\sqrt{x-2}} \quad ⑩ \qquad f(x) = \sqrt{\frac{x+2}{x-2}} \quad ⑨$$


الخطُّ الْبَيَانِيُّ لِتَابِعٍ

3

المَعْلَمُ فِيِ الْمَسْطُوِيِّ



نتأمل في المستوى ثلاث نقاط ليست على استقامة واحدة (O, I, J). ننظر إلى المستقيم (OI) بصفته مستقيم أعداد مبدؤه النقطة O وتكون فاصلة النقطة I عليه مساوية 1. فنحصل بذلك على ما نسميه **محور الفواصل ونرمزه OX** . وبالمثل ننظر إلى المستقيم (OJ) بصفته مستقيم أعداد مبدؤه النقطة O وتكون فاصلة النقطة J عليه مساوية 1. نسمي عادة فاصلة نقطة على المستقيم (OJ) ترتيبها، ونسمى مستقيم الأعداد الثاني **محور التراتيب OY** .



سنقتصر في هذا البحث على الحالة التي يكون فيها المستقيمان متعامدين أي $OI = OJ = 1$ ، و $\angle IOJ = 90^\circ$. نقول في هذه الحالة إنّ لدينا **مَعْلَمًا مُتَجَانِسًا**. وعندما تعين كلُّ نقطة M في المستوى بمعرفة x فاصلة مسقطها على محور الفواصل، و y ترتيب مسقطها على محور التراتيب. فنقول إنّ (x, y) هما إحداثياتنا النقطة M في المعلم المُعطى. وندلُّ عليها بالكتابة : $M(x, y)$.

الخطُّ الْبَيَانِيُّ




تَعْرِيفُهُ


ليكن f تابعاً منطقه D . إنَّ **الخطُّ الْبَيَانِيُّ** C للتابع f في معلم \mathbb{R} هو مجموعة النقاط التي إحداثياتها (x, y) حيث تنتهي x إلى D و $y = f(x)$.

الشرط اللازم والكافي لتنتمي النقطة $M(a, b)$ إلى الخطُّ الْبَيَانِيُّ C هو أن يكون $(a, b) \in C$

كُنْتَ قد رأيْتَ في دراستك السابقة أنَّ **الخطُّ الْبَيَانِيُّ** لتابع تالفي f معرف على \mathbb{R} بصيغة من النمط $f(x) = ax + b$ هو المستقيم الذي معادلته $y = ax + b$. وبالعكس، كلُّ مستقيم في المستوى لا يوازي محور التراتيب هو **الخطُّ الْبَيَانِيُّ** لتابع تالفي معرف على كامل \mathbb{R} .



لعدد a من D صورةٌ وحيدةٌ فقطٌ وفق تابع f ، لذلك يقطع المستقيم المار بالنقطة $A(a, 0)$ موازياً محور التراتيب، الخط البياني للتابع f في نقطة واحدةٍ فقط.



الخطُّ البيانيُّ C في الشكل المجاور، هو التمثيل البياني لتابع f معرف على المجال $[-4, 5]$. لكل a من $[-4, 5]$ صورةٌ واحدةٌ وفق f . فالمستقيم المار بالنقطة $A(a, 0)$ والموازي لـ OY لا يقطع الخطُّ البيانيُّ C إلَّا في نقطةٍ واحدةٍ B هي النقطة التي إحداثياتها $(a, f(a))$.



إذا كان C الخطُّ البيانيُّ لتابع f في معلمٍ، أسمينا الصيغة $y = f(x)$ المعادلة الديكارتية للخطُّ البيانيُّ C ، أو قلنا ببساطة إنَّها معادلة C .



ليكن $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ تابعاً، ولتكن C_f خطُّه البياني. لمعرفة إذا كانت النقطة $A(a, b)$ واقعة على C_f ، نتبع الأسلوب الآتي :

① إذا كان a لا ينتمي إلى D ، فإنَّ A لا تقع على C_f أو $A \notin C_f$.

② إذا كان a ينتمي إلى D ، نحسب $f(a)$ ، ونناقش حالتين :

① إذا كان $f(a) \neq b$ فإنَّ A لا تقع على C_f .


② إذا كان $f(a) = b$ فإنَّ A تقع على C_f .



ليكن $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ تابعاً، ولتكن C_f خطُّه البياني، ولتكن a من D . إذا كانت النقطة A هي النقطة من C_f ، التي فاصلتها a كان ترتيبها هو $f(a)$.



مثال



الخطُّ البيانيُّ C في الشكل المجاور، هو التمثيل البياني لتابع f معرف على المجال $[-4, 5]$. لتعيين صورة -1.5 - أي $f(-1.5)$ نتبع الخطوات الآتية :


- نعيّن -1.5 - على محور الفواصل ونرسم المستقيم المار بهذه النقطة موازياً محور الترتيب.
- يقطع هذا المستقيم الخطُّ البياني C في A .
- نعيّن ترتيب النقطة A برسم المستقيم المار بها موازياً محور الفواصل. فنجد $f(-1.5) = 3.5$.



ليكن $\mathbb{R} \rightarrow D$: f تابعاً، ولتكن C_f خطُّه البياني. ولتكن b عدداً حقيقياً. نتأمل المستقيم

Δ_b المار بالنقطة $(0, b)$ موازياً محور الفواصل. نلاحظ وجود حالتين :

- المستقيم Δ_b لا يتقاطع مع C_f ، فلا يوجد في D أي عنصر صورته وفق f تساوي b . في هذه الحالة نقول إن **b لا تنتمي إلى المستقر الفعلي ل التابع f** .
- المستقيم Δ_b يتقاطع مع C_f في نقطة ولتكن (a, b) ، ويكون $b = f(a)$ لأن $b = f(a)$ في هذه الحالة نقول إن **b تنتمي إلى المستقر الفعلي ل التابع f** .




مثال

الخطُّ البيانيُّ C في الشكل المجاور، هو التمثيل البياني لتابع f معرف على المجال $[5, 4]$. لتعيين الأعداد التي صورة كل منها وفق f تساوي 3، نتبع الخطوات الآتية :

- نعيّن العدد 3 على محور الترتيب، ونرسم المستقيم Δ ذا المعادلة $y = 3$.
- يقطع هذا المستقيم الخطُّ البياني C في نقطتين A و B فاصلتاهمَا 1 و 3 بالترتيب. إن صورة كل من 1 و 3 وفق f هي 3.


- وإذا طلبَ منا تعين الأعداد التي صورة كل منها وفق f تساوي 4.5، نتبع الخطوات الآتية :
- نعيّن العدد 4.5 على محور الترتيب، ونرسم المستقيم Δ' ذا المعادلة $y = 4.5$.
 - لا يقطع هذا المستقيم الخطُّ البياني C . إذن لا ينتمي العدد 4.5 إلى المستقر الفعلي لـ f ، ولا يوجد في $[5, 4]$ عدد صورته وفق f تساوي 4.5.



لا يعطي التمثيل البياني إلا قيمًا تقريرية، وذلك ما لم تكن القيم المطلوبة مذكورة على الرسم. فمثلاً إذا أردنا في المثال السابق معرفة الأعداد التي صوره كل منها وفق f تساوي 1، لاحظنا أن المستقيم Δ الذي معادلته $y = 1$ يقطع $y = f(x)$ في نقطتين A و B فاصلة إدراهما تساوي 4، أمّا فاصلة الثانية فهي « قريبة » من

. -2.4


مثال




تأمل الشكل المجاور. الخطُّ البيانيُّ C ، هو التمثيل البياني لتابع f معরَّف على $[-4, 3]$.

- ① حلٌّ بيانيًّا المعادلة $f(x) = 3$
- ② حلٌّ بيانيًّا المتراجحة $f(x) < 3$

الحل




① يؤول حلُّ المعادلة $f(x) = 3$ في المجال $[-4, 3]$ إلى تعين الأعداد x من هذا المجال التي صوره كلٌ منها وفق f هي 3. لذلك نرسم المستقيم Δ ذو المعادلة $y = 3$. فلاحظ أنه يلقي الخطُّ البيانيُّ C في ثلات نقاط A و B و C . ومنه نستنتج أنَّ حلول المعادلة $f(x) = 3$ هي $x = 2$ و $x = -2$ و $x = -4$.



② يؤول حلُّ المتراجحة $f(x) < 3$ في المجال $[-4, 3]$ إلى إيجاد الأعداد من هذا المجال التي صورتها وفق f أصغر تمامًا من 3. بعد رسم المستقيم Δ ، نعيِّن أجزاء C التي تقع تحت المستقيم Δ ، « لا تصلح النقاط A, B, C لأنَّ ترتيبها يساوي 3 ». بعد ذلك نعيِّن الأجزاء المقابلة من محور الفواصل. فمجموع حلول المتراجحة $f(x) < 3$ هي $[-4, -2] \cup [2, 3]$.

تَدْرِيْجٌ

① بين أي منحنيات التالية هو خط بياني لتابع :



② ليكن C الخط البياني الممثل لتابع f . ترجم العبارات الآتية بعلاقات مساواة تعبّر عنها.

① يمر C بنقطة إحداثياتها $(-2, 5)$.

② يقطع C محور التراتيب بنقطة ترتيبها -1 .

③ يقطع C محور الفواصل بنقطتين فاصلتاها على الترتيب 2 و 3 .

③ ليكن C الخط البياني الممثل لتابع f المعروف على \mathbb{R} بالعلاقة $f(x) = x^2 + 5$.

① بين أي من النقاط $A(-2, 9)$ و $B(3, 13)$ و $C(\sqrt{2}, 7)$ تنتهي إلى C .

② أعطِ إحداثيات أربع نقاط تقع على الخط البياني C .

④ في الشكل المجاور نجد الخط البياني لتابع معروف على المجال $[1, 8]$ ، بقراءة بيانية لهذا الشكل،

بين الصواب من الخطأ في المقولات التالية :

① العدد 1 هو صورة 0 وفق f .

② العدد 0 هو صورة 1 وفق f .

③ العدد 4 هو صورة 3 و 7 وفق f .


• $f(2) = 5$ ④

• $f(3) > 5$ ⑤

للمعادلة $f(x) = 2.5$ ثلاثة حلول. ⑥

⑦ العدد 0.5 هو صورة عدد وحيد من المجال وفق f .

• في حالة $x \in [6, 8]$ لدينا $f(x) > 2$ ⑧



التّابع المتزايد والتّابع المتناقص

4


المتزايد

- كُلما زاد عدد أفراد الأسرة زاد استهلاكم من مياه الشرب، فنقول إنَّ استهلاك الأسرة من مياه الشرب **تابع متزايد** لعدد أفرادها.

- وكُلما زادت سرعة سيارة زادت مقاومة الهواء التي تواجهها. فنقول إنَّ مقاومة الهواء المطبقة على سيارة **تابع متزايد** لسرعتها.

يكون تابع $f(x) : x \mapsto f(x)$ **متزايداً** إذا كَبِيرَت قيم $f(x)$ أكثر فأكثر كلَّما أخذ المتغير x قيمَاً أكبر فأكْبَر.

يبَيِّنُ الشَّكْلُ الْمُجاوِرُ تَمثِيلًا بِيَانِيًّا لِتَابِعٍ مُتزايدٍ عَلَى $[1, 4]$.




- فَأَيًّا كَانَتْ قِيمَ u و v مِنَ الْمَجَال $[1, 4]$ ، إِذَا كَانَ v أَكْبَرَ مِن u ، كَانَ $f(v)$ أَكْبَرَ مِن $f(u)$.
- لَاحِظْ أَنَّهُ لَا يَكْفِي التَّوْقُّعُ مِنْ صِحَّةِ هَذِهِ النَّتِيْجَةِ فَقَطْ عَنْدَ قِيمَتَيْنِ خَاصَّتَيْنِ كَالَّتَيْنِ اخْتَرْنَا هُمَا فِي الشَّكْلِ بَلْ يَجِبُ التَّيقِّنُ مِنْ صِحَّةِ ذَلِكَ عَنْ جَمِيعِ قِيمِ u و v الَّتِي تَحْقِقُ $v > u$.
- لَاحِظْ كَيْفَ يَبْدُو الْخَطُّ الْبَيَانِيُّ لِتَابِعٍ f «صَاعِدًا» عَنْدَمَا نَسْتَعْرِضُهُ مِنَ الْيَسَارِ إِلَى الْيَمِينِ.

المتناقص

- كُلَّما زاد الارتفاع عن سطح الأرض انخفض الضغط الجوي، فنقول إنَّ الضغط الجوي **تابع متناقص للارتفاع عن سطح الأرض**.


يكون تابع $f(x) : x \mapsto f(x)$ **متناصضاً** إذا صَغَرْتْ قيم $f(x)$ أكثر فأكثر كلَّما أخذ المتغير x قيمَاً أكبر فأكْبَر.

يبين الشكل المجاور تمثيلاً بيانيًّاً لتابع متناقصٍ على المجال $[−2, 3]$.



- فأيًّا كانت قيم u و v من المجال $[−2, 3]$ ، إذا كان v أكبر من u ، كان $f(v)$ أصغر من $f(u)$.
- لا نتوتَّن من صحة هذه النتيجة فقط عند قيمتين خاصتين كاللتين اخترناهما في الشكل بل عند جميع قيم u و v التي تحقق $u < v$.
- لاحظ كيف يبدو الخطُّ البيانيُّ الذي يمثل التابع f «هابطاً» عندما نستعرضه من اليسار إلى اليمين.

تعريف



- ليكن f تابعاً، ولتكن I مجالاً محتوى في مجموعة تعريف التابع f .
- نقول إن f متزايدٌ تماماً على I إذا تحقق الشرط : مهما كان العددان الحقيقيان u و v من I فإن المتراجحة $v < u$ تقتضي $f(u) < f(v)$. أي إن f يحافظ على جهة المتراجحة بين u و v .
- نقول إن f متناقصٌ تماماً على I إذا تحقق الشرط : مهما كان العددان الحقيقيان u و v من I فإن المتراجحة $v < u$ تقتضي $f(u) > f(v)$. أي إن f يقلب جهة المتراجحة بين u و v .
- نقول إن f متزايدٌ على I إذا تحقق الشرط : مهما كان العددان u و v من I فإن المتراجحة $v < u$ تقتضي $f(u) \leq f(v)$. الخطُّ البيانيُّ للتابع f صاعد ولكن قد يحتوي على «مساطب» أفقيةً.
- ويكون f متناقصاً على I إذا تحقق الشرط : مهما كان العددان u و v من I فإن المتراجحة $v < u$ تقتضي $f(u) \geq f(v)$. الخطُّ البيانيُّ للتابع f هابط ولكن قد يحتوي على «مساطب» أفقيةً.


في حالة تابع تألفي (أفيني) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, لدينا الحالات الآتية :

- إذا كان $a > 0$ كان f متزايدًا تماماً.
- وإذا كان $a < 0$ كان f متناقصًا تماماً.
- وإذا كان $a = 0$ كان f ثابتًا، أي يأخذ القيمة نفسها مهما كانت قيمة المتغير.

لإثبات أنَّ تابعًا متزايدًا تمامًا، نضع المتراجحة $v < u$ التي نسميها فرضًا، ثم بالاستفادة من




الفرض نبرهن صحة النتيجة $f(u) < f(v)$.



- لنتأمّل حالة $a > 0$. ليكن u و v عددين حقيقيين كييفيين يُحققان $v < u$ ، لمُقارنة المقدارين $f(u)$ و $f(v)$ نحسب الفرق كما تعلّمنا سابقاً :

$$\begin{aligned} f(v) - f(u) &= (av + b) - (au + b) \\ &= \underbrace{a}_{>0} \underbrace{(v - u)}_{>0} > 0 \end{aligned}$$


إذن الشرط $v < u$ يقتضي $f(v) < f(u)$ ، والتَّابع f متزايد تمامًا في هذه الحالة.



- وبالمثل في حالة $a < 0$. إذا كان u و v عددين حقيقيين كييفيين يُحققان $v < u$ ، كان:

$$f(v) - f(u) = \underbrace{a}_{<0} \underbrace{(v - u)}_{>0} < 0$$

إذن الشرط $v < u$ يقتضي $f(v) > f(u)$ ، والتَّابع f متناقص تمامًا في هذه الحالة.



- أمّا في حالة $a = 0$. فالتابع f يأخذ القيمة b أيًّا كانت قيمة المتغير، فهو تابع ثابت.

مثال

تأمل التّابعين f و g الآتيين :

$$g :]-\infty, 0] \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = x^2 \quad \text{و} \quad f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$$

أثبت ما يأتي :

- ① التابع f تابع متزايد تماماً.
- ② التابع g تابع متناقص تماماً.

الحل

① ليكن u و v عددين يُحققان $u < v \leq 0$ ، والمطلوب هو المقارنة بين $f(u)$ و $f(v)$ أي بين العددين u^2 و v^2 . ولكن لدينا $u^2 - v^2 = (u - v)(u + v)$ وهذا نلاحظ ما يأتي :

- نستنتج مباشرةً، استناداً إلى الفرض $v < u$ ، أن $u - v < 0$.
- ولأن $u \leq 0$ و $v > 0$ استنتجنا أن $u + v > 0$.



وبناءً على قاعدة الإشارات نجد $u^2 < v^2$ أي $(u - v)(u + v) < 0$ فالشرط $u < v$ يتحقق $f(u) < f(v)$ ، وهذا يثبت أن التابع f متزايد تماماً على المجال $[0, +\infty[$.

② ليكن u و v عددين يُحققان $0 \leq u < v$ ، والمطلوب هو المقارنة بين $g(u)$ و $g(v)$ أي بين العددين u^2 و v^2 . ولكن لدينا مُجددًا $u^2 - v^2 = (u - v)(u + v)$ ونلاحظ ما يأتي :


- نستنتج مباشرةً، استناداً إلى الفرض $v < u$ ، أن $u - v < 0$.
- ولأن $0 < u < v \leq 0$ استنتجنا أن $u + v < 0$.

إذن بناءً على قاعدة الإشارات نجد $u^2 - v^2 = (u - v)(u + v) > 0$ أي $u^2 > v^2$.

فنكون قد أثبتنا أنه مهما يكن u و v من $]-\infty, 0]$ فالشرط $u < v$ يتحقق $g(u) > g(v)$ ، وهذا يثبت أن التابع g متناقص تماماً على المجال $]-\infty, 0]$.



- ١ تجد في الشكل التالي، الخطوط البيانية لتوابع f و g و h و j و k و ℓ معرفة على مجال I . بين أيّها متزايد تماماً، وأيّها متناقص تماماً وأيّها متزايد وأيّها متناقص وأيّها لا متزايد ولا متناunsch على المجال I .



لنتأمل التابع ② $f : x \mapsto x^2 - 4x$.

١ أثبت أن f متزايد تماماً على المجال $[2, +\infty]$.

٢ أثبت أن f متناقص تماماً على المجال $[-\infty, 2]$.

٣ لنتأمل التابع $f : x \mapsto \frac{1}{x}$ المعرف على $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

١ أثبت أن f متناقص تماماً على المجال $[0, +\infty)$.

٢ أثبت أن f متناunsch تماماً على المجال $(-\infty, 0]$.

٤ لنتأمل التابع $f : x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$ المعرف على \mathbb{R} . أثبت أن f متناunsch تماماً على المجال $[0, +\infty)$.

٥ لنتأمل التابع $f : x \mapsto \sqrt{x}$ المعرف على $[0, +\infty)$. أثبت أن f متزايد تماماً.


جدول اطراد تابع



تعريفه

التابع المطرد على مجال هو تابع متزايد على هذا المجال أو متناقص عليه. أمّا دراسة اطراد تابع f فهي البحث عن المجالات التي يكون عليها التابع f متزايدًا تماماً أو متناصصًا تماماً أو ثابتًا. تلخص عادة هذه الخواص في جدول نسميه **جدول الاطراد**.

مثال



نجد في الشكل المجاور الخط البياني لتابع f معرف على المجال $[-2, 5]$.

نلاحظ من تأمل الخط البياني C_f النقاط التالية :

- إن f متزايد تمامًا على المجال $[-1, 2]$. وببدأ التابع f بالقيمة 3 عند $x = -2$ ليزداد إلى القيمة 4 عند $x = -1$.
- إن f متناقص تمامًا على المجال $[-1, 2]$. إذ يتناقص التابع f من القيمة 4 عند $x = -1$ ليصل إلى القيمة 1 عند $x = 2$.
- إن f متزايد تمامًا على المجال $[2, 5]$. إذ يتزايد التابع f من القيمة 1 عند $x = 2$ ، ليصل إلى القيمة 3 عند $x = 5$.

في الحقيقة يمكن تلخيص هذا الوصف لاطراد التابع f بتنظيم الجدول الآتي الذي يسمى جدول اطراد التابع f :

x	-2	-1	2	5
$f(x)$	3 ↗	4 ↘	1 ↗	3



تأمل الخط البياني لتابع f في المثال السابق وأجب عن السؤالين الآتيين :

- ما هي أكبر قيمة يأخذها التابع f على مجال تعريفه ؟
- ما هي أصغر قيمة يأخذها التابع f على مجال تعريفه ؟

نتأمل تابعاً $f : D \rightarrow \mathbb{R}$. ومجالاً I محتوى في D .

نقول إنّ M هي **أكبر قيمة التابع f على I** إذا تحقق الشرطان الآتيان :

① أيّاً كانت قيمة x من I ، كان $f(x) \leq M$.

② يوجد عدد a في I يحقق $f(a) = M$. (أي إنّ f يأخذ فعلاً القيمة M ، أو يبلغها).

نقول إنّ m هي **أصغر قيمة التابع f على I** إذا تحقق الشرطان الآتيان :

① أيّاً كانت قيمة x من I ، كان $f(x) \geq m$.

② يوجد عدد b في I يحقق $f(b) = m$. (أي إنّ f يأخذ فعلاً القيمة m ، أو يبلغها).

مثال

أتاحت لنا دراسة التابع f تنظيم جدول اطراده المبين فيما يأتي :

x	-5	-1	3	4
$f(x)$	3	↙ 0	↗ 4	↘ 0

① عين انطلاقاً من جدول الاطراد ما يأتي :

① مجموعة تعريف التابع f .

② نقاط مميزة يمر بها الخط البياني للتابع f .

③ دراسة اطراد التابع f .

④ أكبر قيمة وأصغر قيمة للتابع f .

② انطلاقاً من جدول الاطراد السابق والمعلومات التي وصلت إليها آنفًا، ارسم خطأً بيانياً يصلح أن يمثل التابع f .

المعلم

①

① نقرأ مجموعة تعريف f من السطر الأول في الجدول فنجد أنّ التابع f معرف على المجال $[-5, 4]$.

② وفيدينا الجدول مباشرة في تعين صور الأعداد -5 و -1 و 3 و 4 :

$$\cdot f(4) = 0 \quad f(3) = 4 \quad f(-1) = 0 \quad f(-5) = 3$$

فالخط البياني للتابع f يمر بالنقاط $(-5, 3)$ و $(-1, 0)$ و $(3, 4)$ و $(0, 4)$.

③ ونقرأ من الجدول دراسة الاطراد التالية :

- التابع f متناظر تماماً على المجال $[-5, -1]$ ،
- وهو متزايد تماماً على المجال $[-1, 3]$ ،
- ومتناقص تماماً على المجال $[3, 4]$.

④

- أصغر قيم التابع f على $[-5, 4]$ هي 0 وبلغها التابع عند قيمتين للمتغير x هما -1 و 4 ،
- أما أكبر قيم التابع f على المجال $[-5, 4]$ فهي 4 وبلغها عند قيمة واحدة للمتغير x هي 3 .

② يعطي اتجاه الأسهم في جدول الاطراد فكرة عن هيئة الخط البياني. وتفيدنا القيم المبينة في الجدول في القول إن الخط البياني يمر بالنقاط : $A(-5, 3)$ و $B(-1, 0)$ و $C(3, 4)$ و $D(4, 0)$.




يوافق كل من الخطين البيانيين المبينين أعلاه جدول الاطراد المدروس، وهناك بالطبع غيرهما لأننا لا نعرف قيم $f(x)$ عند جميع قيم x في المجال $[-5, 4]$.



تأمل الخط البياني للتابع f في المثال السابق وأجب عن التساؤلات الآتية :

- أَصْحَىْجُ أَنْ $5 \leq f(x)$ أَيًّا كَانَتْ قِيمَةُ x مِنْ الْمَجَالِ $[-5, 4]$ ؟
- أَكِيْكُونُ الْعَدْدُ 5 أَكْبَرُ قِيمَةً f عَلَىِ الْمَجَالِ $[-5, 4]$ ؟
- هَلْ $-1 \geq f(x)$ أَيًّا كَانَتْ قِيمَةُ x مِنْ الْمَجَالِ $[-5, 4]$ ؟
- أَتَكُونُ -1 أَصْغَرُ قِيمَةً f عَلَىِ الْمَجَالِ $[-5, 4]$ ؟
- أَتَكُونُ 3 أَكْبَرُ قِيمَةً f عَلَىِ الْمَجَالِ $[-5, -1]$ ؟




يمثل الخطُّ البيانيُّ في الشكل المجاور تابعاً معرفاً على \mathbb{R} . من الواضح أننا لا نستطيع رسم الخطُّ البيانيُّ للتابع كاملاً لأنَّ المجال \mathbb{R} غير محدود. في مثل هذه الحالة نصلح أنَّ التابع يتبع اطْرَاده بالأسلوب نفسه خارج الجزء المرسوم. أمّا جدول اطْرَاد f فهو :



x	$-\infty$	0	1	$+\infty$		
$f(x)$		↗	1	↘	-1	↗

تَدْرِبْ

١. تجد في الشكل التالي، الخطوط البيانية لتابع f و g و h معرفة على المجال $I = [-1, 3]$. بين الصواب من الخطأ معللاً إجابتك في كلٍّ من القضايا الآتية :






- ١. التابع f ليس متزايداً تماماً على I .
- ٢. أصغر قيم التابع f هي $f(-1)$.
- ٣. أصغر قيم التابع f هي $f(3)$.
- ٤. أصغر قيم التابع g هي $g(-1)$ لأن -1 هو أصغر الأعداد في I .
- ٥. أصغر قيم التابع g على I هي $g(3)$ لأن g متناقص تماماً على I .
- ٦. أكبر قيم التابع h على I هي $h(3)$ ويبلغها التابع f مررتين.
- ٧. أصغر قيم التابع h على كلٍّ من المجالات I و $[-1, 0]$ و $[0, 2]$ هي 0.

مُرئيات ومسائل



1

نتأمل ثلاثة خطوط بيانية C_1 و C_2 و C_3 :



ونتأمل كذلك جداول اطّراد ثلاثة توابع f و g و h :

x	-1	...	3	
$f(x)$...	↗	...	↘ ...

x	-1	3	
$g(x)$...	↘	↗	...	↘ ...

و

x	-1	3		
$h(x)$...	↗	...	↘	...	↗ ...

و

① اقرن كل واحد من التوابع f و g و h مع أحد الخطوط بيانية C_1 و C_2 و C_3 .

② املأ الفراغات في جداول اطّراد كلٌّ من التوابع f و g و h .

2

نتأمل فيما يلي جدول اطّراد تابع f :

x	-3	-1	0	1	3	7
$f(x)$	3	↘ -2	↗ 1	↘ 0	↗ 2	↘ -1

① على كل من المجالات $[7, -3]$ و $[-1, 1]$ و $[-3, 7]$ ، عين أكبر قيم التابع f ، وقيم المتغير x التي يبلغ عنها هذه القيم الكبرى.

② على كل من المجالات $[0, 3]$ و $[-3, 7]$ و $[-1, 7]$ ، عين أصغر قيم التابع f ، وقيم المتغير x التي يبلغ عنها هذه القيم الصغرى.



3 كيف نصور الخطّ البياني الممثل لنابع؟

ليكن f تابعاً معرفاً على المجال $I = [-10, 10]$. نفترض أنه مهما كان العدد الحقيقي x من I كان $x \leq f(x) \leq -1$ ، ونفترض أيضاً أن حلول المعادلة $f(x) = 1$ هي الأعداد $-3 \leq x \leq 4$. ارسم، في معلم متجانس، خطّاً بيانيّاً C يمكن أن يمثل التابع f .

نحو الحل


فهم السؤال

لا تتيح المعلومات المتوفرة عن f ، رسم خطّه البياني رسمًا دقيقًا، لأننا لا نعرف قيم $f(x)$ عندما تتحول x في المجال I . ولكننا نعلم قيم $f(x)$ في حالة $x = -3$ أو $x = 1$ أو $x = 4$. ما عدا ذلك، يمكن أن يأخذ $f(x)$ قيمةً عديدة، وعليه فهناك العديد من الخطوط البيانية التي تصلح لتمثيل f .

ترجمة الشروط المفترضة على f بيانيًّا

- التابع f معرفٌ على $I = [-10, 10]$ ، إذن في أيّ مجالٍ تتحول x ? الخطّ البياني للتابع f محصور بين مستقيمين يوازيان محور التراتيب ويمرّ أولهما بالنقطة $A(a, 0)$ ويمرّ ثانياًهما بالنقطة $B(b, 0)$ عين a و b .
- أيًّا كان x من I كان $x \leq f(x) \leq -1$. نستنتج أن تراتيب نقاط الخطّ البياني للتابع f محصورة بين عددين عينيهما. يقع الخطّ البياني للتابع f بين مستقيمين يوازيان محور الفوائل. اكتب معادلة لكلٍ من هذين المستقيمين.
- حلول المعادلة $f(x) = 1$ هي $x = -3$ و $x = 4$ ، إذن يمر الخطّ البياني للتابع f بثلاث نقاط، ما هي إحداثياتها؟
- هل يقطع المستقيم ذو المعادلة $y = 1$ الخطّ البياني للتابع f في نقاط أخرى غير النقاط الثلاث السابقة؟
- ارسم خطّاً بيانيًّا يمكن أن يمثل f ، ثم ارسم أيضاً بلونٍ مختلفٍ خطّاً بيانيًّا آخر يمكن أن يمثل f .

يبين الشكل المجاور وعاءً مُؤلّفاً من مكعبين متصلين. طول حرف الأول 80 سنتيمتراً وطول حرف الثاني 60 سنتيمتراً. نرمز بالرمز x إلى ارتفاع السائل في الوعاء مُقاساً بالسنتيمتر، وبالرمز $V(x)$ إلى حجم ذلك السائل بالليتر. مثل بياً الحجم $(V(x))$ بدلالة x . خذ سنتيمتراً واحداً لكل 10 سنتيمترات على محور الفواصل، وسنتيمتراً واحداً لكل 50 لি�تراً على محور التراتيب.



نحو الحل

فهم السؤال


لنتخيّل أننا نملأ الوعاء اعتباراً من $0 = x$. نعلم، بالطبع، أنّ حجم السائل يتعلّق بالإرتفاع x ومن ثم فإنّ الحجم V تابع للارتفاع x .

- ما هي مجموعة تعريف V ؟

أُنستطيع حساب بعض قيم V ؟ احسب مثلاً $V(0)$ و $V(50)$ و $V(80)$.

بحثاً عن طريق

لتمثيل V بياً، علينا معرفة $(V(x))$ أيًّا كانت قيمة x . نفترض أننا نملأ الوعاء بدءاً من



$$\cdot x = 0$$

- عندما يكون السائل موجوداً فقط في المكعب الصغير، في أيّ مجال تقع قيمة x ؟ احسب في هذه الحالة $(V(x))$.
- في أيّ مجال تقع قيمة x عندما يكون المكعب الصغير ممتئاً بالسائل وهناك سائل في المكعب الكبير؟ احسب $(V(x))$ بصفته مجموع حجمين بسيطين. واستنتج عبارة $(V(x))$ في هذه الحالة.

- اكتب النتيجة بالشكل التالي :

في حالة $x \in [0, 60]$ يساوي $V(x)$ كذا،

في حالة $x \in [60, 140]$ يساوي $V(x)$ كذا.

أو أملأ الفراغ في الكتابة التالية :

$$\begin{cases} V(x) = \dots : x \in [0, 60] \\ V(x) = \dots : x \in [60, 140] \end{cases}$$

رسم الخط البياني للتابع V

يقودنا تعريف V إلى تمييز حالتين، ومن ثم رسم الجزء الموافق للشرط: x تنتهي إلى المجال $[0, 60]$ أولاً، ورسم الجزء الموافق للشرط: x تنتهي إلى المجال $[60, 140]$ ثانياً. ارسم الخط البياني للتابع V آخذًا بعين الاعتبار الوحدات المبيّنة في نص التمرين.

البحث عن أكبر قيمة لتابع 5

لنتأمل التابع f المعرف على \mathbb{R} بالعلاقة 5

$$\bullet f(x) = -x^2 + 4x + 5 \quad \text{أثبت أن } f(x) \text{ يكتب أيضاً بالشكل}$$

$$\bullet f(x) = 9 - (x - 2)^2 \quad \text{حل المعادلة } f(x) = 9$$

\bullet أثبت أن 9 هي أكبر قيمة للتابع f على \mathbb{R} .

نحو الحل

❶ يجب أن نبرهن أن $-x^2 + 4x + 5 = 9 - (x - 2)^2$. الطريقة هي أن نبدأ من أحد طرفي المساواة ونجري عليه تحويلات لنصل إلى الطرف الآخر. وهنا يُطرح السؤال : من أي طرفين نبدأ ؟ إذا بدأنا من الطرف الأيسر وجب أن نجد طريقة لإظهار مربع كامل فيه، أما إذا انطلقنا من الطرف الأيمن فيكفي أن ننشره. فائي الطرفين تختار لتبدأ به؟

❷ لديك صيغتان للمقدار $f(x)$. اختر المناسبة منها لحل السؤال الثاني.





❸ يجب أن نبرهن أن f يأخذ القيمة 9 وأن $9 \leq f(x)$ أي أن العدد x . اختر الصيغة المناسبة للمقدار $f(x)$ وأثبت المطلوب.

أنجز البرهان واكتبه بلغة سليمة.



6


في هذا التمرين نعطي الخط البياني للتابع f ، ويطلب في كل حالة كتابة جدول الاطراد الموافق.



ارسم خطًا بيانيًّاً لتابع f يُحقق الخواص الآتية : 7

- مجموعة تعريف f هي $\mathbb{D}_f = \mathbb{R}$
- $f(x) > 0$ وإذا كان $x > 2$ كان $f(4) = 2$ و $f(1) = 3$ و $f(-4) = -3$
- جدول اطّراد التابع f هو

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
$f(x)$		\nearrow	4	\searrow	1



الخط البياني g يمثل تابعًا f معروضًا على \mathbb{R} ، ونعطي أنَّ 8

- $f(3.6) = 0$
- ① اكتب جدول اطّراد f .
- ② حلٌّ بيانيًّا كلاً من المتراجحتين $f(x) < 0$ و $f(x) > 0$.
- واستنتج إشارة $f(x)$ تبعًا لقيمة x .
- ③ حلٌّ بيانيًّا للمtragha $f(x) \geq 2$

• ادرس اطّراد التابع $I = [0, +\infty[$ على المجال $f : x \mapsto x^2 - 3$ 9

• ادرس اطّراد التابع $I =]-\infty, 0]$ على المجال $f : x \mapsto x^2 - 3$ 10

• ليكن f التابع المعرف على \mathbb{R} بالعلاقة $f(x) = \frac{x}{3} + |2x - 6|$ 11

① اكتب $f(x)$ بدون استعمال القيمة المطلقة.

② استنتج أنَّ f متناقص تماماً على $[-\infty, 3]$ ، وأنَّه متزايد تماماً على $[3, +\infty[$.

③ أثبت أنَّه إذا كان $x \leq 3$ كان $f(x) \geq 1$.

④ أثبت كذلك أنَّه إذا كان $x \geq 3$ كان $f(x) \geq 1$.

⑤ حلٌّ المعادلة $f(x) = 1$. واستنتج أصغر قيمة للتابع f على \mathbb{R} .

⑥ لماذا لا تقبل المعادلة $f(x) = 0$ حلولاً؟

ليكن f التابع المعرف على المجال $I = [3, +\infty[$ بالعلاقة $f(x) = x - 8 + \frac{4}{x-3}$. أثبت أنَّ 12

القيمة -1 هي أصغر قيمة للتابع f على $[3, +\infty[$.

3


المعادلات والمترابحات من الدرجة الثانية

١ حل معادلة من الدرجة الثانية

٢ تحليل ثلاثي الحدود من الدرجة الثانية وإشارته

٣ العلاقة بين أمثال وجذور ثلاثي حدود من الدرجة الثانية

٤ تطبيقات ونشاطات




رقيم بابلي قيم مكتوب بالمسمارية
يحيى ست عشرة مسالة يؤول حلّ
كل منها إلى معادلة من الدرجة الثانية

هناك العشرات من الرُّقُم الفخارية التي تشير إلى أنَّ البابليين كانوا، قبل الميلاد بألفي سنة، على دراية بدستور حلِّ المعادلة من الدرجة الثانية، هذا ما يؤكده نصٌّ بابليٌّ مكتوب باللغة المسماريَّة القديمة إِذْ نجد فيه المسألة التالية :

”لقد جمعت مساحة مربَّعي وثلثي طول ضلعه
فوجدت $(\frac{35}{60})^2$ ، فما طول ضلع مربَّعي؟“

ويصف بعدها خطوات الحل.

أمّا محمد بن موسى الخوارزمي (780 - 850) فقد حلَّ المعادلة $x^2 + 10x = 39$ كما يلي :



نبدأ بمربيع طول ضلعه x (ومساحته x^2) ومستطيلين طول كلٍّ منها x وعرضه $\frac{10}{2}$. مساحة كلٍّ من هذين المستطيلين $x(\frac{10}{2})$ ، ومساحة كاملِ الشكل تساوي $x^2 + 2(\frac{10}{2})x$. ومن الضروري لإتمام الشكل ليصبح مربعاً أن

نضيف مربعاً جديداً مساحته $\left(\frac{10}{2}\right)^2$. فتكون مساحة المربع المُتمم $\left(x + \frac{10}{2}\right)^2$

$$\left(x + \frac{10}{2}\right)^2 = x^2 + 2\left(\frac{10}{2}\right)x + \left(\frac{10}{2}\right)^2 = 64$$

إذن يساوي طول ضلع المربَّع 8 ، وقيمة المجهول $x = 3$.

المعادلات والمتراجحات من الدرجة الثانية

١ حل معادلة من الدرجة الثانية



نسمى **ثلاثي حدود من الدرجة الثانية** كل تابع f يُكتب بالصيغة

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = ax^2 + bx + c$$

حيث a و b و c ثلاثة أعداد حقيقية معطاة و $a \neq 0$.

ونسمى أي معادلة يمكن أن تكتب بالشكل $f(x) = 0$ ، حيث f ثلاثي حدود من الدرجة الثانية.

معادلة من الدرجة الثانية مجهولها x .

أما حل المعادلة $f(x) = 0$ فهو تعين جميع الأعداد t التي تحقق المساواة $f(t) = 0$ في حال وجودها. وعندئذ يُسمى كل عددٍ من هذه الأعداد **حلًا أو جزراً للمعادلة**.

الصيغة القانونية لثلاثي حدود من الدرجة الثانية

تسمى هذه الخطوة
إتمامًا إلى مربع كامل

للتتأمل ثلاثي حدود من الدرجة الثانية : $x \mapsto f(x) = ax^2 + bx + c$

لما كان $a \neq 0$ ، استنتاجنا أن

$$x^2 + \frac{b}{a}x = \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2}$$

وذلك لأن $x^2 + \frac{b}{a}x$ هو مجموع الحدين الأول والثاني من منشور

$$\begin{aligned} f(x) &= a\left(\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a}\right) = a\left(\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{4ac}{4a^2}\right) \\ &= a\left(\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}\right) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a} \end{aligned}$$

تُسمى الصيغة الأخيرة لثلاثي الحدود $x \mapsto f(x)$ **صيغة القانونية**.

مثال

اكتب ثلاثي الحدود من الدرجة الثانية $x \mapsto P(x) = 2x^2 + x + 1$ ، بصيغته القانونية واستنادً من تلك الصيغة لتثبت أن العدد $\frac{7}{8}$ هو أصغر قيم التابع P .

المحل

في الحقيقة لدينا

$$\begin{aligned} P(x) &= 2\left(x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\right) \\ &= 2\left(x^2 + 2\frac{1}{4}x + \left(\frac{1}{4}\right)^2 - \left(\frac{1}{4}\right)^2 + \frac{1}{2}\right) \\ &= 2\left(\left(x + \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{7}{16}\right) \end{aligned}$$

إذن الصيغة القانونية لثلاثي الحدود P هي

$$P(x) = 2\left(x + \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{7}{8}$$



وهنا نتذكّر أن مربع عدد حقيقي موجب دوماً، ولا يساوي الصفر إلا إذا انعدم هذا العدد. إذن

مهما كان العدد الحقيقي x كان $0 \leq \left(x + \frac{1}{4}\right)^2 \leq 2$ ، ومن ثم

$$P(x) \geq \frac{7}{8} = P\left(-\frac{1}{4}\right)$$

أي إن القيمة $\frac{7}{8}$ هي أصغر قيم التابع P .

تجربة

① اكتب بالصيغة القانونية ثلاثيات الحدود من الدرجة الثانية الآتية :

$$x^2 + 6x \quad ② \quad x^2 - 4x + 1 \quad ①$$

$$-3x^2 + x + 4 \quad ④ \quad x^2 - x + 1 \quad ③$$

$$-x^2 + 5x - 6 \quad ⑥ \quad -x^2 + 2x - 1 \quad ⑤$$

② عين أصغر قيم التابع $x \mapsto x^2 + 4x + 8$

③ عين أكبر قيم التابع $x \mapsto -x^2 + 2x + 1$

حل المعادلة من الدرجة الثانية



تعريف

نتأمل **ثلاثي حدود من الدرجة الثانية** $x \mapsto ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$). لقد رأينا أن الصيغة القانونية لثلاثي الحدود هذا هي :

$$ax^2 + bx + c = a \left(\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \right)$$

يُسمى العدد $b^2 - 4ac$ **مميز المعادلة من الدرجة الثانية** $ax^2 + bx + c = 0$ أو **مميز ثلاثي الحدود** $ax^2 + bx + c = 0$. ونرمز إليه بالرمز Δ (يقرأ «دلتا»). عندئذ يكون لدينا

$$ax^2 + bx + c = a \left(\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right) : \quad \Delta = b^2 - 4ac$$

■ في حالة $\Delta < 0$ ، يكون $\frac{\Delta}{4a^2}$ سالباً تماماً، وأيًّا كانت قيمة x كان ما بين القوسين موجباً تماماً، فلا تقبل المعادلة $ax^2 + bx + c = 0$ في هذه الحالة حلوًّا.

■ في حالة $\Delta = 0$ ، يكون $\frac{\Delta}{4a^2}$ صفرًا، ونجد $x = -\frac{b}{2a}$ جذرًا وحيدًا، هو $ax^2 + bx + c = 0$

■ وأخيراً، في حالة $\Delta > 0$ ، يكون $\frac{\Delta}{4a^2}$ ومن ثم

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= a \left(\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \left(\frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \right)^2 \right) \\ &= a \left(x + \frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \right) \left(x + \frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \right) \end{aligned}$$

تذكرة

$$u^2 - v^2 = (u - v)(u + v)$$

فإذا عرفنا :

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{و} \quad x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

وجدنا

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$$

ولأن $\Delta \neq 0$ ، استنتجنا أن للمعادلة $ax^2 + bx + c = 0$ جذرين مختلفين هما x_1 و x_2 .

بذلك تكون قد أثبتنا الخاصّة التالية :



لتكن المعادلة $\Delta = b^2 - 4ac$ ، ول يكن مميزها $(a \neq 0)$ ، $ax^2 + bx + c = 0$

- في حالة $\Delta < 0$ ، ليس للمعادلة جذور.

- في حالة $\Delta = 0$ ، للمعادلة جذرٌ وحيد $x = -\frac{b}{2a}$ (يُسمى جذراً مضاعفاً).

- في حالة $\Delta > 0$ ، للمعادلة جذاران مختلفان هما

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{و} \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$



على ماذا تحصل إذا طبّقت العلاقتين اللتين تحسّبان x_1 و x_2 في حالة $\Delta = 0$ ؟ أتّرى لماذا يُسمى

العدد $-\frac{b}{2a}$ جذراً مضاعفاً في حالة $\Delta = 0$ ؟



حلّ كلاً من المعادلات الآتية

$$x^2 - 3x + 4 = 0 \quad ①$$

$$3x^2 - \frac{7}{2}x + \frac{49}{48} = 0 \quad ②$$

$$3x^2 - x - 4 = 0 \quad ③$$



① هنا $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times 4 = -7$ ، و $a = 1, b = -3, c = 4$ استنتجنا أنه ليس لهذه المعادلة حلول.

② هنا $\Delta = (-\frac{7}{2})^2 - 4 \times 3 \times \frac{49}{48} = 0$ ، و $a = 3, b = -\frac{7}{2}, c = \frac{49}{48}$ استنتجنا أنّ لهذه المعادلة جذراً مضاعفاً.

$$x_0 = \frac{-b}{2a} = \frac{7}{12}$$

③ هنا $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 3 \times (-4) = 49$ ، و $a = 3, b = -1, c = -4$ استنتجنا أنّ لهذه المعادلة جذريْن مختلفين، هما :

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{1+7}{2 \times 3} = \frac{4}{3} \quad \text{و} \quad x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{1-7}{2 \times 3} = -1$$



ليس من المفيد دوماً استعمال الممّيز Δ عند حل المعادلات من الدرجة الثانية. فعلى سبيل المثال تكتب المعادلة $4x^2 - 5 = 0$ بالشكل $(2x + \sqrt{5})(2x - \sqrt{5}) = 0$ ، إذن مجموعة حلولها هي

$$\mathcal{S} = \left\{ -\frac{\sqrt{5}}{2}, \frac{\sqrt{5}}{2} \right\}$$

وكذلك تكتب المعادلة $7x^2 + 3x = 0$ بالشكل $x(7x + 3) = 0$ ، إذن مجموعة حلولها هي

$$\mathcal{S} = \left\{ -\frac{3}{7}, 0 \right\}$$


تأمل المعادلة $ax^2 + bx + c = 0$ ، افترض أن العددين a و c **إشارتين مختلفتين**، ما هي إشارة الممّيز Δ في هذه الحالة؟ وما هي الخاصّة التي تستنتجها بشأن جذور المعادلة؟



١ حلّ المعادلات الآتية دون استعمال الممّيز:

$$x^2 - 9 = 0 \quad ② \qquad x^2 - 5x = 0 \quad ①$$

$$1 - (3x - 1)^2 = 0 \quad ④ \qquad x^2 + 4 = 0 \quad ③$$

٢ حلّ المعادلات الآتية :

$$-x^2 + 2x - 1 = 0 \quad ② \qquad x^2 + x - 6 = 0 \quad ①$$

$$3x^2 - 12x + 12 = 0 \quad ④ \qquad u^2 + 5u - 6 = 0 \quad ③$$

$$x^2 + 1.1x + 0.1 = 0 \quad ⑥ \qquad -m^2 + m - 20 = 0 \quad ⑤$$

$$x^2 - (2 + \sqrt{3})x + 1 + \sqrt{3} = 0 \quad ⑧ \qquad x^2 - 3\sqrt{2}x + 4 = 0 \quad ⑦$$

٣ حلّ أيضاً المعادلات الآتية :

$$\sqrt{2}t^2 - 3t + \sqrt{2} = 0 \quad ② \qquad 3x^2 - 4\sqrt{7}x - 12 = 0 \quad ①$$

$$(2x - 1)^2 - 4 = 0 \quad ④ \qquad 2x - x^2 - 2 = 0 \quad ③$$

$$(2 - t - t^2)^2 = 0 \quad ⑥ \qquad x^3 - 8x^2 + 12x = 0 \quad ⑤$$

٤ عين قيمة الوسيط الحقيقي m التي يكون عندها للمعادلة $x^2 - 4x + m - 1 = 0$ جذر مضاعف؟ واحسب عندئذ هذا الجذر.

٢

تحليل ثلاثي الحدود من الدرجة الثانية وإشارته



تحليل ثلاثي الحدود من الدرجة الثانية

ليكن ثلاثي الحدود من الدرجة الثانية $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) ، ولنفترض أنَّ مميِّزه $\Delta = b^2 - 4ac$ موجب تماماً. لقد وجدنا، عند إثبات المبرهنة السابقة، أنه في هذه الحالة، يكتب ثلاثي الحدود بالصيغة :

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$$

حيث x_1 و x_2 هما جذرا المعادلة $f(x) = 0$. وهذا ما يسمح لنا بتحليل ثلاثي الحدود f إلى جداء عوامل من الدرجة الأولى.

أمّا في حالة $\Delta = 0$ فيمكن تحليل f إلى جداء عوامل من الدرجة الأولى كما يلي :

$$f(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2$$

وأخيراً، في حالة $\Delta < 0$ لا يمكن تحليل f إلى جداء عوامل من الدرجة الأولى.



حلّ كثير الحدود $P(x) = 2x^2 - 5x + 2$ ، ثمَّ عين إشارته تبعاً لقيمة المتغير x .



هنا لدينا 2 ، فللمعادلة جذران هما

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{5 + 3}{4} = 2 \quad \text{و} \quad x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{5 - 3}{4} = \frac{1}{2}$$

ويتحلّل P كما يلي :

ولتعيين إشارة P نُنشئ جدول الإشارات كما يأتي :

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	2	$+\infty$
$x - \frac{1}{2}$	-	0	+	+
$x - 2$	-	-	0	+
$P(x)$	+	0	-	0

إذن $P(x)$ سالب تماماً على المجال $[-\infty, \frac{1}{2}]$ و موجب تماماً على كلٍّ من المجالين $[\frac{1}{2}, 2]$ و $[2, +\infty]$.

إشاره ثلاثي الحدود من الدرجة الثانية



في الحقيقة يمكن تعليم المثال السابق كما يأتي :



لنتأمل ثلاثي الحدود من الدرجة الثانية : $f(x) = ax^2 + bx + c$ ، ولتكن Δ ممِيزاً.

- في حالة $\Delta < 0$ ، تكون للمقدار $f(x)$ إشاره a نفسها أيًّا كان x من \mathbb{R} .
- في حالة $\Delta = 0$ ، تكون للمقدار $f(x)$ إشاره a نفسها (إلا عندما $x = -\frac{b}{2a}$ إذ يكون عندئذ $f(x) = 0$).
- في حالة $\Delta > 0$ ، تكون للمقدار $f(x)$ إشاره a إذا لم تقع x بين جذري f ، وإذا وقعت x بين الجذرين، خالفت إشاره $f(x)$ إشاره a .

لنكتب f بالصيغة القانونية :



$$\cdot f(x) = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right]$$

- في حالة $\Delta < 0$ ، يكون لما بين القوسين [] إشاره موجبة تماماً. إذن للمقدار $f(x)$ إشاره a نفسها أيًّا كان x من \mathbb{R} .
- في حالة $\Delta = 0$ ، يكون للمقدار $f(x)$ إشاره a نفسها أيًّا كان $x \neq -\frac{b}{2a}$.
- في حالة $\Delta > 0$ ، يكون $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ فهو جداء ثلاثة عوامل، أحدها ثابت a ، وكل واحد من العاملين الآخرين ثانوي حد من الدرجة الأولى، فمن السهل دراسة إشارتهما تبعاً لقيمة x . فإذا رمزنا بالرمز x_1 إلى أصغر جذري $f(x)$ ، وبالرمز $\text{sgn}(a)$ إلى إشاره a حصلنا على الجدول الآتي :

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$
a	$\text{sgn}(a)$	$\text{sgn}(a)$	$\text{sgn}(a)$	
$x - x_1$	-	0	+	+
$x - x_2$	-	-	0	+
$(x - x_1)(x - x_2)$	+	0	-	0
$f(x)$	$\text{sgn}(a)$	0	$-\text{sgn}(a)$	0
				$\text{sgn}(a)$

يُلخص الجدول الآتي المبرهنة السابقة

$\Delta < 0$	$\Delta = 0$	$\Delta > 0$	
لا تفريق موجود	$a(x - x_0)^2$	$a(x - x_1)(x - x_2)$	تفرق $f(x)$
لا حلول موجودة	حل وحيد x_0	حلان x_2 و x_1	$f(x) = 0$
إشاره a			$f(x)$ إشاره



حل كلاً من المتراجحتين :

$$x^2 + 2x + 2 > 0 \quad ①$$

$$-x^2 + 2x + 3 \geq 0 \quad ②$$



- ❶ نحسب مميز ثالثي الحدود $x^2 + 2x + 2$ ، أي $\Delta < 0$ ، إذن ليس لكثير الحدود جذور. ولما كان $a = 1$ ، أي $a > 0$ ، استنتجنا أن $x^2 + 2x + 2 > 0$ ، أيًا كان العدد الحقيقي x .
- ❷ هنا مميز ثالثي الحدود $-x^2 + 2x + 3$ يساوي $\Delta = 16$ فللمعادلة $-x^2 + 2x + 3 = 0$ جذران $x_1 = -1$ و $x_2 = 3$. ولما كان $a = -1$ ، أي $a < 0$ ، استنتجنا أن مجموعة حلول المتراجحة هي المجال $[-1, 3]$.



❸ حل كلاً من ثلاثيات الحدود الآتية إلى جداء ضرب عوامل من الدرجة الأولى:

$$f(x) = 2x^2 - 5x + 2 \quad ② \quad f(x) = x^2 - 7x + 10 \quad ①$$

$$f(x) = -\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x + 1 \quad ④ \quad f(x) = -3x^2 + 4x + 4 \quad ③$$

❹ فيما يأتي، ادرس تبعاً لقيم x إشاره ثالثي الحدود المُعطى:

$$f(x) = -x^2 + 2x - 3 \quad ② \quad f(x) = x^2 + x - 2 \quad ①$$

$$f(x) = -x^2 + 6x - 5 \quad ④ \quad f(x) = x^2 - 4x + 4 \quad ③$$

❺ حل كلاً من المتراجحات الآتية:

$$x^2 + x - 20 \leq 0 \quad ② \quad x^2 - 3x + 2 > 0 \quad ①$$

$$x^2 + 4 \geq 0 \quad ④ \quad x(x - 2) < 0 \quad ③$$

$$2x^2 - 24x + 72 < 0 \quad ⑥ \quad -x^2 - 9 \geq 0 \quad ⑤$$

العلاقة بين أمثل وجدور ثلثي حدود من الدرجة الثانية



ليكن ثلثي الحدود من الدرجة الثانية $f(x) = ax^2 + bx + c$ ، ولنفترض أن مميزه $\Delta = b^2 - 4ac$ موجب تماماً. عندئذ يتحقق x_1 و x_2 جذرا المعادلة $f(x) = 0$ الخاصتين الآتيتين:

$$x_1 x_2 = \frac{c}{a} \quad \text{و} \quad x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

في الحقيقة، لقد رأينا أنه في هذه الحالة تتحقق المساواة $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ أيًّا كانت قيمة x . وبالنشر نستنتج أن

$$ax^2 + bx + c = ax^2 - a(x_1 + x_2)x + ax_1 x_2$$

ولأنَّ هذه المساواة صحيحة أيًّا كانت قيمة x ، كانت صحيحة في الحالة الخاصة $x = 0$ ، وهذا يعني

$$\text{أن } x_1 x_2 = \frac{c}{a} \text{ ، أو } c = ax_1 x_2 \text{ . إذن أيًّا كانت قيمة } x :$$

$$ax^2 + bx = ax^2 - a(x_1 + x_2)x$$

فإذا عوّضنا مجدداً $x = 1$ استناداً إلى $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$. بعد الاصلاح، أن $b = -a(x_1 + x_2)$ أو



تأمل المعادلة $ax^2 + bx + c = 0$ ، وافتراض أنَّ مميزها $\Delta = b^2 - 4ac$ موجب تماماً. لقد وجدت سابقاً صيغة كل من جذريها x_1 و x_2 . احسب باستعمال هذه الصيغ المقادرين $x_1 + x_2$ و $x_1 x_2$ واستنتاج برهاناً آخر للمُبرهنة السابقة.



في حالة $\Delta = 0$ ، تُعطي العلاقات $x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}$. وهذا ما يجعلنا نقول إن للمعادلة جذرين متساوين، أو إن لها جذراً مضاعفاً. هل تبقى صيغة مجموع الجذرين وصيغة جداء ضربهما المبينتان سابقاً صحيحتين عند تساوي الجذرين ؟

نتأمل المعادلة من الدرجة الثانية :

$$x^2 - 2x - \sqrt{2} = 0$$

نلاحظ أن $a = 1$ و $c = -\sqrt{2}$ أي إن إشارتي العددين a و c مختلفان، فلهذه المعادلة جذران مختلفان x_1 و x_2 . كيف نحسب المقدار $A = x_1^2 + x_2^2$ دون حساب الجذرين؟ في الحقيقة، لما كان كل من x_1 و x_2 حل للمعادلة المعطاة كان

$$\begin{aligned} x_1^2 &= 2x_1 + \sqrt{2} \\ x_2^2 &= 2x_2 + \sqrt{2} \end{aligned}$$

وبجمع هاتين المساواتين طرفاً إلى طرف نستنتج أن

$$A = x_1^2 + x_2^2 = 2(x_1 + x_2) + 2\sqrt{2}$$

$$\cdot A = 2 \times 2 + 2\sqrt{2} = 4 + 2\sqrt{2} . \text{ إذن } x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = -\frac{b}{2}$$



❶ توثق أن 2 هو حل للمعادلة $x^2 - 5x + 6 = 0$. ما مجموع جذري هذه المعادلة؟ وما جداء ضربهما؟ استنتاج الحل الآخر.

❷ توثق أن -1 هو حل للمعادلة $x^2 + 3x + 2 = 0$. ما مجموع جذري هذه المعادلة؟ وما جداء ضربهما؟ استنتاج الحل الآخر.

❸ لتكن (E) المعادلة $2x^2 + x - m = 0$

❶ كيف نختار العدد الحقيقي m كي يكون العدد $x = -1$ جذراً للمعادلة (E)؟

❷ استنتاج الجذر الآخر.

❹ في حالة كل من المعادلات الآتية، أوجد أحد الجذرين ذهنياً، واستنتاج الجذر الآخر دون حساب المميز:

$$-3x^2 + 2x + 5 = 0 \quad ② \qquad x^2 - 7x + 6 = 0 \quad ①$$

$$x^2 + 5x + 4 = 0 \quad ④ \qquad x^2 + 3x - 10 = 0 \quad ③$$

$$2x^2 + \sqrt{5}x - 15 = 0 \quad ⑥ \qquad x^2 - \sqrt{2}x - 4 = 0 \quad ⑤$$

❺ جد العددين الحقيقيين m و n لتكون المعادلتان الآتيتان متكافئتين.

$$3x^2 - (m+6)x + 1 - n = 0 \quad \text{و} \quad x^2 - mx + m - n = 0$$

تطبيق : الأرث


يمتلك رجل قطعة أرض بشكل مثلث ABC قائم في C ، وطولاً ضلعه القائمين $[AC]$ و $[BC]$ يساويان 80 m و 40 m بالترتيب. أوصى الرجل أن يتقاسم أولاده الثلاثة عادل وعدنان وعمر هذه الأرض على الوجه الآتي :

يأخذ عادل، الابن البكر، جزءاً من قطعة الأرض بشكل مستطيل أحد رؤوسه C ، ويقع رأسه المقابل على الوتر $[AB]$ وتكون مساحته أكبر ما يمكن. ثم يختار عدنان إحدى القطعتين المثلثتين الشكل الباقيتين، ويأخذ عمر القطعة الأخيرة.


طلب من عادل تنفيذ عملية توزيع الحصص. فكيف نساعده على تحقيق ذلك ؟

المعلم

بدايةً نلاحظ أنَّ اقتطاع عادل لقطعة أرضه المستطيلة يمكن أن يجري بطرائق عدَّة، كما يوضَّح الشكل ، فكيف يختار عادل أكبر هذه القطع مساحةً ؟



يتعين المستطيل المنشود بمعرفة طول أحد ضلعيه، ولكن قبل توضيح ذلك لنثبت بعض الرموز الإضافية، سنسمي $CDEF$ المستطيل الذي يرمز إلى أرض عادل، وسنرمز بالرمز x إلى طول القطعة $[CF]$.



لما كان المثلثان EBF و ABC متشابهين، لتساوي زوايا الأول مع الزوايا الموافقة من الثاني، استنتجنا أنَّ

$$\frac{40-x}{40} = \frac{EF}{80} \quad \text{أو} \quad \frac{BF}{BC} = \frac{FE}{CA}$$

وهذا يعطي طول الضلع الثاني $[EF]$ للمستطيل $CDEF$ بدلالة x ، إذ نجد $EF = 2(40 - x)$

وعليه إذا رمزنا بالرمز $A(x)$ إلى مساحة المستطيل $CDEF$ بدلالة المتغير x كان

$$A(x) = CF \cdot EF = 2x(40 - x) = -2x^2 + 80x$$



ولكن هذه معرفة قديمة بالنسبة إلينا! فالتابع $A(x) \mapsto A(x)$ هو تابع حدودي من الدرجة الثانية

وهو موضوع بحثنا، فلماذا لا نستثمر هنا ما تعلمناه؟

لنبدأ بكتابة A بالصيغة القانونية عن طريق الإتمام إلى مربع كامل كما يأتي :


$$A(x) = -2(x^2 - 40x + 400 - 400) = -2(x - 20)^2 + 800$$

واضح أن $-2(x - 20)^2 \leq 0$ ، فيكون المقدار $A(x)$ أكبر ما يمكن عندما $x = 20$ ، أي $A(20) = 800$ هي أكبر قيمة للتابع .

إذن يحصل عادل على أكبر المستويات مساحةً عندما

$$EF = 2(40 - x) = 40 \text{ m} \quad \text{و} \quad CF = x = 20 \text{ m}$$

ونكون مساحة قطعة أرضه $20 \times 40 = 800 \text{ m}^2$ ، وهي نصف مساحة $.ABC$



أما قطعنا الأرض المتبقيةان فهما "طريقتان" ومساحة كلٌّ منها تساوي ربع مساحة $.ABC$ ، (عل).



الختار الصعب : تخيل أنك باحث عن الذهب. تريد شراء قطعة أرض يمكن أن تكون غنية بعروق الذهب، شريطة أن تكون على هيئة مستطيل محيطه معطى ولنقل $2p$. يعرض البائع عليك عدة قطع أرض متساوية السعر ومحطيتها p . تدرك على الفور أنَّ من مصلحتك الإجابة عن السؤال الآتي :

أين جميع قطع الأرض المعروضة، قطعة مساحتها أكبر ما يمكن؟ ما أبعادها؟

① نرمز بالرمز x إلى أحد بعدي المستطيل. تيقن أنَّ مساحته تعطى بالعلاقة :

$$S(x) = -x^2 + px$$

② اكتب $S(x)$ بالصيغة القانونية. عند أي قيمة للمتغير x يكون $S(x)$ أكبر ما يمكن. ثم احسب بعدي المستطيل الموافق.

تَدْرِيبٌ : مَعَالَاتٌ وَمُتَرَاجِحَاتٌ مُضَاعِفَةِ التَّرْبِيعِ



لتأمل المسألة الآتية: أيوج عدد حقيقي يكون مجموع مربعه ومقلوب مربعه مساوياً 6 ؟
تؤول هذه المسألة إلى حل المعادلة : $x^2 + \frac{1}{x^2} = 6$ في $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ ، وهي تكافئ في المجموعة نفسها المعادلة (E) الآتية :

$$(E) \quad x^4 - 6x^2 + 1 = 0$$

المعادلة (E) هي معادلة من الدرجة الرابعة، تسمى **معادلة مضاعفة التربيع**، إذ لا تضم سوى الحدين x^4 و x^2 والحد الثابت.

① حل المعادلة (E)

① أثبت أنه إذا كان x_0 حلّاً للمعادلة (E) ، كان $t_0 = x_0^2$ حلّاً للمعادلة (E') التالية

$$(E') \quad t^2 - 6t + 1 = 0$$

② بالعكس، أثبت أنه إذا كان العدد الموجب t_0 حلّاً للمعادلة (E') ، كان $x_1 = \sqrt{t_0}$ و $x_2 = -\sqrt{t_0}$ حلّين للمعادلة (E) .
③ أوجد إذن حلول المعادلة (E) .

لحل معادلة مضاعفة التربيع، نستعمل مجهاً مساعداً، فنضع $t = x^2$.



② حل معادلات ومتراجحات مضاعفة التربيع


حل كلًّا من المعادلات أو المتراجحات المضاعفة التربيع الآتية:

$$2x^4 - \frac{3}{2}x^2 + 1 = 0 \quad ② \qquad x^4 - x^2 + 12 = 0 \quad ①$$

$$x^4 - 3x^2 - 4 \geq 0 \quad ④ \qquad x^4 + 2x^2 + 1 = 0 \quad ③$$

$$x^4 - 10x^2 + 9 \leq 0 \quad ⑥ \qquad x^4 - 5x^2 + 6 > 0 \quad ⑤$$


مُنِيَّاتٍ وَمَسَائِلٍ



- 1** نجد في الشكل المجاور: قطعاً مكافئاً P معادلته في معلم متاجنس هي $y = x^2$. على مستقيم d معادلته $y = x + 2$.
أوجد إحداثيات نقطتي تقاطع الخطين P و d .

2 نتأمل ثالثي حدود من الدرجة الثانية $P(x) = ax^2 + bx + c$.

① احسب بدلالة a و b و c المقادير الآتية:



$$\begin{aligned} P(0) & \quad \text{👉} \\ \frac{P(1) - P(-1)}{2} & \quad \text{👉} \\ \frac{P(1) + P(-1) - 2P(0)}{2} & \quad \text{👉} \end{aligned}$$

- ② المنحني المبين في الشكل المجاور هو الخط البياني التابع ثالثي حدود من الدرجة الثانية $P(x) = ax^2 + bx + c$ معروف على \mathbb{R} .
عين a و b و c مستفيداً من المعلومات المتوفرة في التمثيل البياني.

3 ادرس إشارة كلٌ من كثيرات الحدود الآتية تبعاً لقيم x .

$$\begin{array}{ll} f(x) = 3 - 2x + x^2 & ② \quad f(x) = x^2 - x - 6 \quad ① \\ f(x) = -x^2 + \sqrt{2}x - 1 = 0 & ④ \quad f(x) = -2x^2 + x + 1 \quad ③ \end{array}$$

4 حل كلاً من المترافقات الآتية:

$$\begin{array}{ll} x^2 - 5x + 7 > 0 & ② \quad x^2 + 4x - 12 < 0 \quad ① \\ 3x(1-x) < 0 & ④ \quad -2x^2 + 12x - 18 \geq 0 \quad ③ \\ (2x-3)(x+5) \leq 0 & ⑥ \quad 29x \geq x^2 - 96 \quad ⑤ \end{array}$$

5 أوجد الأعداد الحقيقية m التي تجعل ثالثي الحدود $f(x) = -x^2 + 2x - m$ سالباً على \mathbb{R} .



6

حل متراجحة من النمط

$$\frac{ax + b}{cx + d} \geq \frac{a'x + b'}{c'x + d'}$$

$$\cdot \frac{-2x}{x + 1} \geq \frac{4x + 3}{x - 2}$$

نحو الحل

من المفيد، قبل حل متراجحة، تحديد قيم x التي لا تكون وضوحاً حلولاً لها. لماذا لا يمكن أن يكون العددان $x = -1$ و $x = 2$ حلّين للمتراجحة (I) ؟

إذن سنحل المتراجحة (I) في المجموعة $\mathbb{R} \setminus \{-1, 2\}$.

لحل متراجحة من الشكل $A(x) - B(x) \geq 0$. من المفيد، عموماً، كتابتها : ليس من السهل معرفة إشارة فرق. لذلك نختزل الكسر بإرجاعه إلى مقام مشترك.

أثبت أنه على $\mathbb{R} \setminus \{-1, 2\}$ ، تكافيء المتراجحة (I) المتراجحة

$$\frac{-6x^2 - 3x - 3}{(x + 1)(x - 2)} \geq 0$$

لنضع

$$C(x) = \frac{-6x^2 - 3x - 3}{(x + 1)(x - 2)}$$

تُعرف إشارة C من معرفة إشارة البسط، وإشارة المقام. ولما كان المقام مكتوباً أصلاً على هيئة جداء، فتُعرف إشارته من إشارة الحدين $(x + 1)$ و $(x - 2)$.

① ادرس إشارة بسط $C(x)$ وإشارة مقامه.

② الطريقة لتحديد إشارة $C(x)$ تتمثل بكتابه جدول إشارات للبسط والمقام. افع ذلك.


③ أعطِ مجموعة حلول المتراجحة (I) .

أنجز الحل واكتبه بلغة سليمة.



كتاب المعاذلة المُوافقة لمسألة

7



نُثِّتَ خيطاً طوله 89 cm من طرفيه إلى مسامرين A و B المسافة بينهما 65 cm.

يُطلب تبيان إذا كان بالإمكان شد الخيط بطريقة تجعل المثلث ACB قائماً في C . ثم أعد السؤال في الحالة التي يكون فيها طول الخيط مساوياً 91 cm.

نحو الحل

بالنظر إلى الشكل نرى أن السؤال المطروح يُؤول إلى معرفة إذا كان بالإمكان إنشاء مثلث قائم الزاوية يُحقق الشروط المطلوبة. نعرف من المثلث المطلوب طول الضلع AB ، ونجهل طولي الضلعين AC و CB . ولكن المثلث ACB قائم، إذن هناك في الحقيقة مجهول واحد.

لنرمز بالرمز x إلى AC . عبر عن BC بدلالة x .

باقي أن نعبر، بمعادلة، عن كون المثلث ACB قائماً في C ، وتبيان إذا كان لهذه المعادلة حلول.

① اكتب هذه المعادلة ثم حلها.

② أيكون الحالان اللذان وجدهما مقبولين؟

③ أعد الخطوات السابقة عندما يساوي طول الخيط 91 cm.

أنجز الحل واكتبه بلغة سليمة.



8

ليكن m عدداً حقيقياً، ولتكن f التابع من الدرجة الثانية المُعرَّف وفق

$$\cdot f(x) = x^2 - (m+1)x + 4$$

① ما قيمة m التي يكون للمعادلة $f(x) = 0$ عند كل منها جذرٌ وحيد؟ احسب عندئذ هذا الجذر.

② ما قيمة m التي لا يكون للمعادلة $f(x) = 0$ عند أي منها أي حل.

9

حلَّ كلاً من المعادلات الآتية:

$$3x^2 + (x-2)(x+3) = 12 \quad ② \qquad x(x+1) + x^2 - 1 = 0 \quad ①$$

$$\frac{x^2 + 2x - 1}{x+1} = 2x - 1 \quad ④ \qquad 4(x+3)^2 - (x-5)^2 = 0 \quad ③$$

$$\frac{1}{x+2} - \frac{2}{2x-5} = \frac{9}{4} \quad ⑥ \qquad \frac{3x}{x+2} - \frac{x+1}{x-2} = -\frac{11}{5} \quad ⑤$$

حلًّا كلاً من المتراجحات الآتية:

$$(2x - 1)^2 > (x + 1)^2 \quad ② \quad \frac{2x^2 + 5x + 3}{x^2 + x - 2} > 0 \quad ①$$

$$\frac{x + 3}{1 - x} \geq -5 \quad ④ \quad (x + 3)(x - 1) < 2x + 6 \quad ③$$

حلًّا كلاً من المعادلات الآتية :

$$2x^4 - x^2 + 1 = 0 \quad ② \quad 4x^4 - 5x^2 + 1 = 0 \quad ①$$

$$4x^2 - 35 - \frac{9}{x^2} = 0 \quad ④ \quad x^4 - 8x^2 - 9 = 0 \quad ③$$

$$x^4 + 5x^2 + 4 = 0 \quad ⑥ \quad -2x^4 + 12x^2 - 16 = 0 \quad ⑤$$

حلًّا كلاً من المعادلات الآتية:

$$\sqrt{x - 4} = x + 1 \quad ② \quad \sqrt{4 - x} = x - 2 \quad ①$$

$$\sqrt{2x - 6} = x - 3 \quad ④ \quad \sqrt{x^2 - 12} = 2x - 6 \quad ③$$

لاحظ أنَّ الشرط $\sqrt{a} = b$ يُكافئ تحققَ الشرطين : $(a = b^2)$ و $(b \geq 0)$ في آنٍ معاً.



حلًّا كلاً من المعادلتين الآتيتين:

$$\sqrt{3x + 3} = \sqrt{x^2 + x - 8} \quad ② \quad \sqrt{x + 12} = \sqrt{x^2 + 2x - 8} \quad ①$$

لاحظ أنَّ الشرط $\sqrt{a} = \sqrt{b}$ يُكافئ تحققَ الشرطين : $(a = b)$ و $(b \geq 0)$ في آنٍ معاً.



أيوجد عدداً طبيعياً متالياً جداء ضربهما يساوي 4970 ؟


في كل من الحالات الآتية، أيوجد عدداً طبيعياً جداء ضربهما يساوي 4970 ؟

احسب هذين العددين في حال وجودهما.

$$S = 18, \quad P = 65 \quad ①$$

$$S = -1, \quad P = -42 \quad ②$$

$$S = 4, \quad P = 5 \quad ③$$



نتأمل نصف دائرة قطرها $AB = 5$ ، و M نقطة من القطعة $[AB]$.

نرسم نصفي دائرة قطر اهما $[AM]$ و $[MB]$ كما في الشكل المجاور.

$$\cdot AM = x$$

① احسب بدالة x مساحة السطح المحدّ بالدوائر الثلاث S .

② أثمنّ تعبيّن للنقطة M بحيث تكون النسبة بين S ومساحة نصف الدائرة التي قطرها $[AB]$

$$\text{مساوية للمقدار } \frac{8}{25} ?$$

أوجد جميع ثلثيات الأعداد الطبيعية المتتالية التي يساوي مجموعها جداءً ضربها.

4

التّوابع المألوفة

- 1 التّابع الحدوديّة من الدرجة الثانية
- 2 تابع المقلوب
- 3 المستقيم الحقيقي والدائرة المثلثية
- 4 النّسب المثلثية لعدد حقيقي

تعود فكرة قياس الزوايا بالدرجات إلى البابليين، فَهُم مَنْ قَسَّمَ الدائرة إلى 360° ، وربما يعود ذلك إلى العلاقة الوثيقة التي تربط قياس الزوايا بعلم الفلك وإلى كون عدد أيام السنة قريب من 360 يوماً.

مُعْظَمُ ما نعرفه عن الرياضيات التي تطورت في بلاد ما بين النهرين، من قِبَلِ السومريين بداية ثُمَّ من قِبَلِ الأكَادِيِّين وغيرهم من شعوب المنطقة، حدثٌ نسبياً. يُسمى هذا الموضوع باسم **الرياضيات البابلية**، وكأنه عصارة العمل الفكري لشعبٍ واحدٍ بعينه. لقد بقي العديد من الرُّقُم الفخاريَّة المكتوبة باللغة المسماريَّة مجهولَ المحتوى إلى أن تمكنَ العالم «أوتو نيوغباور» من فك شифرتها في الثلاثينيات من القرن الماضي. لقد وُجِدَ أَنَّ هذه الرُّقُم تحتوي على نصوص وعلى جداول رياضيَّات، وهذا ما ألقى ضوءاً جديداً على مُساهمة البابليين في تطوير الرياضيات القديمة.

يعود حوالي ثُلثي الرُّقم المكتشفة إلى الفترة ما بين 1800 و 1600 قبل الميلاد. واستناداً إلى هذا المصدر الغنيّ من المواد، نعلم أنَّ بإمكان البابليين الآن ادعاء السبق بشأن مبرهنة فيثاغورث مثلاً. احتوى العديد من الرُّقُم على جداول تحوي مربعات الأعداد من 1 وحتى 50، أليس هذا أول ظهور للتابع التَّربيعِيِّ ! وهناك جداول تحوي مكعبات الأعداد، وجذوراً تربيعية وجذوراً تكعيبية. وكذلك عُثِرَ على جداول تحوي الأعداد ونواتج قسمة 60 عليها، وهذا أول ظهور لتابع المقلوب!.

التابع المألفة


التابع الاحدوبيّة من الدرجة الثانية




تابع التربيع $x \mapsto x^2$

لكل عددٍ حقيقيٍ مربع، فالتابع $f : x \mapsto x^2$ الذي يقرن بكل عددٍ حقيقيٍ مربعٍ معروف على كامل \mathbb{R} . ولقد رأينا عند دراسة الاطراد في الفصل الثاني ما يلي :

- إنَّ التابع $f : x \mapsto x^2$ متفاوضٌ تماماً على المجال $[-\infty, 0]$.
- إنَّ التابع $f : x \mapsto x^2$ متزايدٌ تماماً على المجال $[0, +\infty)$.



تابع التربيع متفاوض تماماً على المجال $[-\infty, 0]$




تابع التربيع متزايد تماماً على المجال $[0, +\infty)$

ومنه نستنتج جدول اطراد التابع $f : x \mapsto x^2$ حيث نلاحظ أن $f(0) = 0$ هي أصغر قيم هذا التابع.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$x \mapsto x^2$	↙	0	↗

نسمى الخطَّ البيانيَّ \mathcal{P} الممثُّل للتابع f قطعاً مكافاً كما نسمى النقطة O ذروة القطع.



في معلمٍ متجانس يكون محور التراتيب **محور تناظر** للقطع المكافئ \mathcal{P} ذلك لأنَّه أيَّاً كان العدد الحقيقي x ، انتمت النقطتان $M(x, x^2)$ و $M'(-x, x^2)$ ، المتاظرتان بالنسبة إلى محور التراتيب، إلى القطع المكافئ \mathcal{P} .

التابع من الدرجة الثانية



ليكن ثلثي الحدود من الدرجة الثانية : $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = ax^2 + bx + c$ حيث a و b و c ثلاثة أعداد حقيقة معطاة و $a \neq 0$. لقد وجدنا في دراستنا السابقة أن f يكتب بالصيغة القانونية :

$$f(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a}$$

تُعمّم المُبرهنة التالية خواصَ اطراد التابع التربيعي على التابع من الدرجة الثانية :




ليكن ثلثي الحدود من الدرجة الثانية : $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = ax^2 + bx + c$:

١ في حالة $a > 0$

▪ التابع f متافق تماماً على المجال $[-\infty, -\frac{b}{2a}]$.

▪ التابع f متزايد تماماً على المجال $[-\frac{b}{2a}, +\infty]$.

x	$-\infty$	$-\frac{b}{2a}$	$+\infty$
$f(x)$	\searrow	m	\nearrow




حيث $m = f(-\frac{b}{2a})$ هي أصغر قيمة يأخذها التابع f .

٢ في حالة $a < 0$

▪ التابع f متزايد تماماً على المجال $(-\infty, -\frac{b}{2a})$.

▪ التابع f متافق تماماً على المجال $(-\frac{b}{2a}, +\infty)$.

x	$-\infty$	$-\frac{b}{2a}$	$+\infty$
$f(x)$	\nearrow	M	\searrow



حيث $M = f(-\frac{b}{2a})$ هي أكبر قيمة يأخذها التابع f .

لثبتت على سبيل المثال حالة $a > 0$ ، تاركين الحالات $a < 0$ للطالب.



▪ ليكن u و v عددين من المجال $(-\infty, -\frac{b}{2a})$ يتحققان $u < v$ عندئذ لمقارنة $f(u)$ و $f(v)$:

نحسب، كما تعوّدنا، الفرق بين هذين المقدارين :

$$\begin{aligned} f(v) - f(u) &= (av^2 + bv + c) - (au^2 + bu + c) \\ &= a(v^2 - u^2) + b(v - u) \\ &= a(v - u)\left(u + v + \frac{b}{a}\right) \end{aligned}$$

ولكن المقدارين a و $v - u$ موجبان. إذن إشارة $f(v) - f(u)$ هي نفسها إشارة $(u + v + \frac{b}{a})$ وهنا نتذكّر أن u و v ينتميان إلى $]-\infty, -\frac{b}{2a}]$ ، أي $u < -\frac{b}{2a} \leq v$ و إذن $u + v < \left(-\frac{b}{2a}\right) + \left(-\frac{b}{2a}\right) = -\frac{b}{a}$ أو $u + v + \frac{b}{a} < 0$. فنستنتج أن $f(v) - f(u) < 0$ أو $f(v) < f(u)$. وهكذا تكون قد أثبتنا أن متافقاً تماماً على المجال $]-\infty, -\frac{b}{2a}]$ في هذه الحالة.

• ليكن u و v عددين من المجال $\left[-\frac{b}{2a}, +\infty\right[$ وجدنا أن :

$$f(v) - f(u) = a(v - u)\left(u + v + \frac{b}{a}\right)$$

ولكن المقدارين a و $v - u$ موجبان. إذن إشارة $f(v) - f(u)$ هي نفسها إشارة $(u + v + \frac{b}{a})$ ولأن u و v ينتميان إلى $[-\frac{b}{2a}, +\infty[$ ، استنتاجنا أن $v < -\frac{b}{2a} \leq u$ و إذن $u + v > \left(-\frac{b}{2a}\right) + \left(-\frac{b}{2a}\right) = -\frac{b}{a}$ أو $u + v + \frac{b}{a} > 0$. فنستنتج أن $f(v) - f(u) > 0$ أو $f(v) > f(u)$. وهكذا تكون قد أثبتنا أن متزايداً تماماً على المجال $[-\frac{b}{2a}, +\infty[$ في هذه الحالة.

الخلاصة

ليكن ثلاثي الحدود من الدرجة الثانية : $(a \neq 0) f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = ax^2 + bx + c$


• نسمى الخط البياني للتابع f قطعاً مكافئًا ونرمز إليه بالرمز \mathcal{P} .

• في حالة $a > 0$ ، تكون فتحة القطع من الأعلى ، ويبلغ f أصغر قيمة عند $x = -\frac{b}{2a}$

• في حالة $a < 0$ ، تكون فتحة القطع من الأسفل ، ويبلغ f أكبر قيمة عند $x = -\frac{b}{2a}$

• في كلا الحالتين تكون $x = -\frac{b}{2a}$ هي فاصلة ذروة القطع \mathcal{P} .

• ويكون المستقيم المار بالذروة موازياً لمحور التراتيب ، محور تناظر للقطع \mathcal{P} .



من أين جاءت هذه الخاصية التنازليّة للقطع المكافئ؟ استعمل الصيغة القانونية لثلاثي الحدود f ، ثم احسب $f\left(\frac{-b}{2a} - h\right)$ و $f\left(\frac{-b}{2a} + h\right)$ حيث h هو عدد حقيقيٌ ما. ماذا تستنتج؟

نتأمل التابع المعرف على \mathbb{R} بالصيغة $f(x) = -2x^2 - 4x + 3$

- ① اكتب جدول اطراد f ، وبيّن ما إذا كان يبلغ أكبر قيمه وعيّنها إن وجدت.
- ② عيّن محور تناظر القطع المكافئ P الذي يمثل f ، وارسمه.
- ③ بيّن أن المعادلة $f(x) = 0$ حلّين ، واحصر كلاً منها بعديدين صحيحين متاليين.
- ④ احسب $f\left(\frac{1}{2}\right)$ و $f\left(\frac{3}{5}\right)$. ماذا تستنتج بشأن جذور المعادلة $f(x) = 0$.

المعلم

❶ نلاحظ أن $f(x) = ax^2 + bx + c$ هو بالصيغة $f(x) = -2x^2 - 4x + 3$ حيث $a = -2$ و $b = -4$ و $c = 3$. ونلاحظ أن مُعامل الحد الذي يحوي x^2 هو $a = -2 < 0$. ولأن استنتاجنا أن فتحة القطع المكافئ P الذي يمثل f من الأسفل.


$$f(x) = -2x^2 - 4x + 3 = -2(x^2 + 2x + 1 - 1) + 3 = -2(x + 1)^2 + 5$$

إذن فاصلة S ، ذروة القطع المكافئ P ، هي قيمة x التي ت عدم المقدار $(x + 1)^2$ ، فهي -1 ، $y = f(-1) = 0 + 5 = 5$. إذن ذروة القطع P هي $S(-1, 5)$.

ونرى أن التابع f جدول الاطراد الآتي :

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f(x)$	\nearrow	5	\searrow

وأن f يبلغ أكبر قيمه وهي 5 عند $x = -1$.



❷ محور التنازلي Δ يمر بالذروة ومعادلته $x = -1$. لرسم P ، نعيّن على الشكل النقطة S ومحور التنازلي Δ . ثم نعيّن بعض النقاط المساعدة مثل $A(0, 3)$ و $B(1, -3)$ ، ونعيّن نظائرها C و D ، بالترتيب ، بالنسبة إلى محور التنازلي Δ . ثم نصل بينها محترمين الهيئة العامة للقطع المكافئ .

❸ لما كان ممِيز المعادلة $f(x) = 0$ هو $\Delta = b^2 - 4ac = 40 > 0$ ، فللمعادلة جذران . لنرمز إلى أصغرهما بالرمز x_1 وإلى أكبرهما بالرمز x_2 . قيم التابع f موجبة (عكس إشارة a) بين الجذرين وسالبة خارجهما . ولما كان $f(0) = f(-2) = 3 > 0$ استنتجنا أن $0 < x_2 < -2 < x_1$. ولما كان $f(-3) = f(1) = -3 < 0$ إذن 1 أكبر من أكبر الجذرين أي $x_2 < -3$. وكذلك لدينا $x_1 \in]-3, -2[$ و $x_2 \in]0, 1[$. نستنتج أن $x_1 \in]-3, -2[$ و $x_2 \in]0, 1[$.

بالطبع كان بالإمكان حساب الجذرين x_1 و x_2 :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{4 - 2\sqrt{10}}{-4} = -1 + \frac{1}{2}\sqrt{10}$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{4 + 2\sqrt{10}}{-4} = -1 - \frac{1}{2}\sqrt{10}$$

وتحقق من النتيجة السابقة بلاحظة أن $2 < \sqrt{10} < 4$

- ٤ نجد بالحساب مباشرةً أن $f\left(\frac{3}{5}\right) = -\frac{3}{25} < 0$ و $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} > 0$ إذن ، وباستعمال تناظر القطع المكافئ نستنتج أيضًا أن $x_1 \in \left]-\frac{5}{2}, -\frac{13}{5}\right[$



١ أكمل جدول الاطراد الآتي للتابع التربيعي $f : x \mapsto x^2$ ، ثم املأ الفراغ في المتراجحات التالية :

x	$-\infty$	-7	0	$5\sqrt{2}$	$+\infty$
$x \mapsto x^2$		\searrow	\searrow	\nearrow

١ إذا كان $-7 < x$ كان x^2

٢ إذا كان $x \geq 5\sqrt{2}$ كان x^2

٣ إذا كان $.....x^2 7 - x < 5\sqrt{2}$ كان $.....x^2 7 - x < 5\sqrt{2}$.

٢ علّ لماذا تكون المقولات الآتية خطأ :

١ إذا كان $x \leq 1$ كان $x^2 \leq 1$.

٢ إذا كان $x < -\sqrt{10}$ كان $x^2 < 10$.

٣ بين الصواب من الخطأ فيما يأتي :

١ إذا كان $5 < x$ كان $x^2 < 25$.

٢ إذا كان $x \geq 2\sqrt{7}$ كان $x^2 \geq 28$.

٣ إذا كان $10^2 - 10^3 < x \leq 10^2$ كان $x^2 < 10^6$.

- ٤ نتأمل فيما يلي التابع f المعروف على \mathbb{R} بالصيغة المعطاة. اكتب جدول اطراد f ، وبين ما إذا كان يبلغ أكبر قيمه أو أصغرها وعيتها إن وجدت. ثم عين محور تناظر القطع المكافئ P الذي يمثل f ، وارسمه.

$$f(x) = 3x^2 + 3x + 1 \quad ② \quad f(x) = -2x^2 + 4x - 3 \quad ①$$

$$f(x) = 3 - x^2 \quad ④ \quad f(x) = x^2 - 3 \quad ③$$

$$f(x) = -4x^2 - 4x + 1 \quad ⑥ \quad f(x) = x^2 - 4x + 6 \quad ⑤$$

٢ تابع المقلوب

تابع المقلوب 

لكل عدد حقيقي غير معدوم مقلوب، أما الصفر فليس له مقلوب. نستنتج أنَّ التابع $f : x \mapsto \frac{1}{x}$ معرف على اجتماع المجالين $[-\infty, 0) \cup (0, +\infty]$ الذي نرمز إليه بالرمز \mathbb{R}^* .



يحقق تابع المقلوب $f : x \mapsto \frac{1}{x}$ المعرف على \mathbb{R}^* الخصائص التاليتين :

- التابع f متناقص تماماً على المجال $[0, +\infty)$.
- التابع f متناقص تماماً على المجال $(-\infty, 0)$.

أيًّا كان العددان الحقيقيان غير المعدومين u و v كان

$$f(u) - f(v) = \frac{1}{u} - \frac{1}{v} = \frac{v - u}{uv}$$


لنفترض أن $v < u$ أي $v - u > 0$ ولنميز حالتين :

▪ u و v عنصران من المجال $[0, +\infty)$. عندئذ يكون $uv > 0$. وبناءً على قاعدة الإشارات نجد


$f(u) - f(v) > 0$ ، أي $\frac{v - u}{uv} > 0$.] $0, +\infty$ [

▪ u و v عنصران من المجال $(-\infty, 0)$. عندئذ يكون $uv > 0$ أيضاً. وبناءً على قاعدة

الإشارات نجد $f(u) - f(v) > 0$ ، أي $\frac{v - u}{uv} > 0$.] $-\infty, 0$ [



تابع المقلوب متناunsch تماماً على المجال $[0, +\infty)$




تابع المقلوب متناunsch تماماً على المجال $(-\infty, 0)$

ومنه نستنتج جدول اطراد التابع المقلوب . $f : x \mapsto \frac{1}{x}$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$x \mapsto \frac{1}{x}$		↘	↘

يشير الخطان الشاقولييان في الجدول السابق إلى كون التابع المقلوب غير معروف عند الصفر. نسمّي الخط البياني \mathcal{H} الممثّل للتابع f قطعاً زائداً.



في معلم متاجنس يكون المبدأ O مركز تناظر للقطع الزائد \mathcal{H} ذلك لأنّه مهما كان العدد الحقيقي غير المعدوم x ، كانت النقطتان $M'(-x, -\frac{1}{x})$ و $M(x, \frac{1}{x})$ من \mathcal{H} ، اللتين فاصلتاها بالترتيب x و $-x$ ، متاظرتين بالنسبة إلى المبدأ O .



- عندما يكون x موجباً و«كبيراً» يكون $\frac{1}{x}$ قريباً من الصفر وتكون النقطة $M(x, \frac{1}{x})$ قريبة من محور الفواصل.
- عندما يكون x موجباً وقريباً من الصفر يكون $\frac{1}{x}$ «كبيراً جداً» وتكون النقطة $M(x, \frac{1}{x})$ «علية جداً» وقريبة من محور التراتيب.
- الخط البياني لتابع المقلوب لا يتقاطع مع أيٌ من المحورين الإحداثيين.

مثال

ادرس اطراد التابع f المعروف على مجموعة الأعداد الحقيقية غير المعدومة بالعلاقة $f(x) = -\frac{2}{x}$ وارسم خطّه البياني في معلم متاجنس.

الحل


لدرس التابع f على المجال $[0, +\infty)$. نعلم أنَّ التابع $g : x \mapsto \frac{1}{x}$ متافق تماماً على المجال $[0, +\infty)$. وأياً كان العدوان u و v الموجبان تماماً فإنْ $v < u$ تقتضي $\frac{1}{u} > \frac{1}{v}$ ومن ثم $-\frac{2}{u} < -\frac{2}{v}$ (ضربنا بعدد سالب). إذن التابع f متزايد تماماً على المجال $[0, +\infty)$.

ونجد بالمثل أنَّ f تابع متزايد تماماً أيضاً على $(-\infty, 0]$.

ومنه جدول الاطراد التالي للتابع f :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$	/\		/\

لرسم الخط البياني \mathcal{H} للتابع f ، نختار عليه بعض النقاط مثل $(4, -\frac{1}{2})$ و $(2, -1)$ و $(1, -\frac{1}{2})$ و $(-2, -4)$ و $(-4, \frac{1}{2})$ ونطئها بالنسبة إلى المبدأ ثم نرسم الخط البياني بما يتفق مع جدول الاطراد.



تَدْرِّبْ

① حل في مجموعة الأعداد الحقيقية \mathbb{R} ، كلاً من المتراجحات الآتية، ثم ارسم الخط البياني للتابع

$$x \mapsto f(x) = \frac{1}{x} \quad \text{وتوثّق من صحة نتائجك.}$$

$$-2 < \frac{1}{x} < 2 \quad ③$$

$$\frac{1}{x} > -\frac{1}{4} \quad ②$$

$$0 < \frac{1}{x} < \frac{1}{4} \quad ①$$

$$2 \leq \frac{1}{x} \leq 3 \quad ⑥$$

$$\frac{1}{x} > \frac{4}{3} \quad ⑤$$

$$\frac{1}{x} < \frac{1}{4} \quad ④$$

② ليكن f التابع المعرف على $[2, +\infty] \cup [2, +\infty]$ وفق الصيغة

لماذا حُذفت القيمة 2 من مجموعة تعريف f ①

ادرس اطراد f على كل من المجالين $I_2 = [2, +\infty]$ و $I_1 = [-\infty, 2]$ ②

اكتب جدول اطراد f ③

حل المتراجحتين $f(x) > 1$ و $f(x) < 1$ ④

نظم جدولًا بقيم $f(x)$ الموافقة لقيم x من المجموعة $\{-1, 0, 1, 3, 4, 5\}$ ، ثم استفد من هذه

الدراسة في رسم الخط البياني C_f لهذا التابع على $[-1, 2] \cup [2, 5]$ ⑤

ليكن f التابع المعرف على $[0, +\infty]$ وفق الصيغة


ادرس اطراد f على كل من المجالين $I_2 = [1, +\infty]$ و $I_1 = [0, 1]$ ①

استنتج أصغر قيمة يأخذها التابع f ②

المستقيمُ الْحَقِيقِيُّ والدائرةُ الْمُثَلِّثَةُ ③

العلاقة بين المستقيم المُحَقِيقِيُّ والدائرةُ الْمُثَلِّثَةُ

لنتأمل في معلم متاجنس دائرة C مركزها O ونصف قطرها r يساوي واحدة الطول أي $r = 1$. ولنتأمل كذلك محوراً حقيقياً Δ مماثلاً لمحور التراتيب ويوازيه ماراً بالنقطة $A(1,0)$ كما في الشكل.




ثم لنفترض أن المحور Δ مرنٌ ويمكن لفه حول الدائرة C كما يوضح الشكل. فتروح نقاط Δ لتطبّق على نقاط الدائرة C . لما كان طول محيط الدائرة C مساوياً 2π ، كان طول ربع الدائرة مساوياً $\frac{\pi}{2}$ ، فالنقطة التي فاصلتها $\frac{\pi}{2}$ على Δ ستتطبّق على النقطة $B(0,1)$ من الدائرة C . والنقطة التي فاصلتها π على Δ ستتطبّق على النقطة $A'(-1,0)$ من الدائرة C . وبالأسلوب نفسه نرى أن النقطة التي فاصلتها $\frac{\pi}{2}$ على Δ ستتطبّق على النقطة $B'(0,-1)$.

وهكذا نرى النقطة التي فاصلتها x على المحور Δ سوف تتطبّق على نقطة محددة تماماً M من الدائرة C ، وعندما سوف تتطبّق جميع نقاط المحور Δ التي فوافصلها من الشكل $x + 2\pi k$ (حيث k هو عدد صحيح ما) على النقطة M نفسها، لأن طول محيط C يساوي 2π .

لاحظ أنه عندما تتحرك النقطة التي فاصلتها x على المحور Δ **بالاتجاه الموجب** تتحرك صورتها M على الدائرة C **عكس جهة دوران عقارب الساعة**.

تعريف



نسمّي الدائرة، التي نصف قطرها واحدة الطول والمدرّجة كما شرحنا أعلاه حيث تكون جهة الحركة الموجبة عليها هي عكس جهة دوران عقارب الساعة، **الدائرة المثلثية**.



لثبت إدّاً هذه الأفكار : نقرن بكل عدد حقيقي x نقطة واحدة M من الدائرة المثلثية C . نبدأ بتعيين النقطة A من هذه الدائرة ثم نميز حالتين :

- **حالة $x \geq 0$** . ننتقل على الدائرة المثلثية بالاتّجاه الموجب انطلاقاً من النقطة A ونقطع مسافة قدرها x ، (قد نضطر للدوران حول الدائرة عدة مرات)، فتكون النقطة M الممثلة للعدد الحقيقي x هي النقطة التي توقف عندها بعد قطع المسافة المطلوبة.


فمثلاً نقرن بالعدد $\frac{\pi}{2}$ النقطة B لأنّ القوس \widehat{AB} ربع دائرة فطوله يساوي $\frac{2\pi}{4}$ أي $\frac{\pi}{2}$ ، كما نقرن بالعدد 0 النقطة A وبالعدد π النقطة A' وبالعدد $\frac{3\pi}{2}$ النقطة B' .

- **حالة $x \leq 0$** . في هذه الحالة ننتقل على الدائرة المثلثية بالاتّجاه السالب انطلاقاً من النقطة A قاطعين مسافة قدرها $|x|$.


فمثلاً نقرن بالعدد $-\frac{\pi}{2}$ النقطة B' لأنّ $-\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$. وإذا انطلقنا من النقطة A متوجهين بالاتّجاه السالب وقطعنا مسافة قدرها $\frac{\pi}{2}$ فإنّنا نصل إلى النقطة B' .

مثال

عيّن على الدائرة المثلثية النقطة M الممثلة للعدد الحقيقي $x = \frac{621\pi}{4}$ وكذلك النقطة N الممثلة للعدد الحقيقي $y = -\frac{29\pi}{3}$.




■ لتمثيل النقطة M على الدائرة علينا قطع مسافة $\frac{621\pi}{4}$ انطلاقاً من النقطة A ، متوجهين بالاتجاه الموجب للدوران. ومن الواضح أن قوساً من الدائرة طولها $\frac{621\pi}{4}$ تحوي عدّة دورات. نقسم 621 على 4 فجده: $621 = 155 \times 4 + 1$ ، ومن ثم فإن $\frac{621\pi}{4} = 155\pi + \frac{\pi}{4}$. ولكن المقدار 155π يمثل 77 دورة ونصف الدورة. فإذا انطلقنا من النقطة A وقطعنا مسافة تعادل 77 دورة ونصف الدورة، لوصلنا إلى النقطة A' ، ثم قطع بعد ذلك مسافة $\frac{\pi}{4}$ بالاتجاه الموجب فنصل إلى النقطة M منتصف القوس $\widehat{A'B'}$.



■ لتمثيل النقطة N على الدائرة علينا قطع مسافة $\frac{29\pi}{3}$ انطلاقاً من النقطة A متوجهين بالاتجاه السالب للدوران. وبملاحظة أن $\frac{29\pi}{3} = 9\pi + \frac{2\pi}{3}$ وأن 9π تمثل أربع دورات ونصف الدورة، فعليها الانطلاق من النقطة A وقطع مسافة تعادل أربع دورات ونصف بالاتجاه السالب فنصل إلى A' ، ثم نتابع فنقطع بعد ذلك مسافة $\frac{2\pi}{3}$ بالاتجاه السالب لنصل إلى النقطة N المماثلة للعدد $-\frac{29\pi}{3}$. نلاحظ أن النقطة N هي أيضاً النقطة المماثلة للعدد $-\frac{\pi}{3}$.



الراديان واحدة جديدة لقياس الزوايا

تعريف



لتأمل نصفين مستقيمين $[OU]$ و $[OV]$ ، لتعيين قياس الزاوية $\angle UOV$ ننشئ دائرة مثلثية C مركزها O ، فنقطع نصف المستقيم $[OU]$ في نقطة A ونصف المستقيم $[OV]$ في B . وعندما نسمّي طول القوس \widehat{AB} من الدائرة المثلثية قياس الزاوية $\angle UOV$ مقدراً **بالراديان**.

وعلى هذا يكون قياس الزاوية المستقيمة π رadians وقياس الزاوية القائمة $\frac{\pi}{2}$ رadians وهكذا ...




 لنتأمل قوساً $\widehat{A'B'}$ تُقابل زاوية قياسها α رadians من دائرة C' مركزها O ونصف قطرها يساوي R . إن C' هي صورة الدائرة المثلثية C التي مركزها O وفق التحاكي الذي نسبته R . والقوس $\widehat{A'B'}$ هو صورة القوس \widehat{AB} من C الذي يقابل أيضاً زاوية قياسها α رadians لأن التحاكي يحافظ على قياسات الزوايا. عليه يكون طول القوس $\widehat{A'B'}$ مُساوياً لطول القوس \widehat{AB} (أي α) مضروباً بنسبة التحاكي (أي R).

طول قوس \widehat{AB} تُقابل زاوية قياسها α رadians من دائرة نصف قطرها R يساوي αR .

العلاقة بين قياس زاوية بالراديان وقياسها بالدرجات

هناك تناسب بين قياسات الزوايا بالدرجات وقياساتها بالراديان، وعليه فإن زاوية قياسها 180°

تكافئ زاوية قياسها π رadians وزاوية قياسها 45° تكافئ زاوية قياسها $\frac{\pi}{4}$ رadians.



زاوية قياسها A° درجة هي زاوية قياسها $A \times \frac{\pi}{180}$ رadians.

يوضح جدول التناوب أدناه العلاقة بين قياس الزوايا بالدرجات وقياسها بالراديان :

d	180	قياس الزاوية بالدرجات
α	π	قياس الزاوية بالراديان

$$\text{الذي يترجم العلاقة} \cdot \frac{180}{\pi} = \frac{d}{\alpha}$$

وفي ما يلي جدول بعض القيم الخاصة :

قياس الزاوية بالدرجات	قياس الزاوية بالراديان
150	$\frac{5\pi}{6}$
135	$\frac{3\pi}{4}$
120	$\frac{2\pi}{3}$
60	$\frac{\pi}{3}$
45	$\frac{\pi}{4}$
30	$\frac{\pi}{6}$

مثال

١ ما قياس زاوية مقدراً بالراديان إذا علمت أنها تساوي 20° ؟

٢ ما قياس زاوية مقدراً بالدرجات إذا علمت أنها تساوي $\frac{2\pi}{7}$ رadians ؟

المعلم

$$\text{نستفيد من العلاقة} \cdot \frac{180}{\pi} = \frac{d}{\alpha}$$

١ في هذا السؤال، $d = 20^\circ$ والمجهول هو α ، ومنه : $\alpha = \frac{20 \times \pi}{180} = \frac{\pi}{9}$

٢ في هذا السؤال، $d = \frac{180 \times \frac{2\pi}{7}}{\pi} = \frac{360}{7} \approx 51^\circ 26'$ والمجهول هو $\alpha = \frac{2\pi}{7}$ ، ومنه :

ćدرَبَهْ

١ احسب طول القوس من دائرة نصف قطرها 10 cm إذا علم أنها تقابل زاوية مرکزية قياسها :

١ بالدرجات : $180^\circ, 120^\circ, 90^\circ$.

٢ بالراديان : $0.2, 1, \frac{2\pi}{3}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}$

٢ ارسم دائرة مثلثية، وعِين عليها النقاط M الممثلة للأعداد الحقيقية الآتية :

$$z = -\frac{8\pi}{3} \quad ③ \qquad y = -\frac{29\pi}{4} \quad ② \qquad x = \frac{49\pi}{3} \quad ①$$

$$v = -\frac{17\pi}{4} \quad ⑥ \qquad u = \frac{15\pi}{4} \quad ⑤ \qquad t = \frac{7\pi}{6} \quad ④$$


النسبة المثلثية لعدد حقيقيٌ

4

جيبيه عددٌ حقيقيٌ و جيبيه تمامٌ



تعريف



- لتأمل في معلم متجانس دائرة مثلثية C مركزها O . ليكن x عدداً حقيقياً ولنقرن به النقطة M من الدائرة المثلثية كما في الفقرة السابقة.
- نعرف **جيب تمام x** ، أو **جيب x** ، بأنه فاصلة النقطة M ، ونرمز إليه بالرمز $\cos x$.
 - ونعرف **جيب x** بأنه ترتيب النقطة M ونرمز إليه بالرمز $\sin x$.

مبرهنَة أساسية



أياً كان العدد الحقيقي x كان $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$

في الحقيقة، نعلم أن إحداثيات النقطة M الموافقة للعدد x هي $(\cos x, \sin x)$. نستنتج من ذلك أن



$$OM^2 = \cos^2 x + \sin^2 x$$

ولكن $OM = 1$ ، إذن $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$

خواص أساسية لجيبيه عددٌ حقيقيٌ و جيبيه تمامٌ




① أياً كان العدد الحقيقي x كان $\sin(x + 2\pi) = \sin x$ و $\cos(x + 2\pi) = \cos x$

لتكن M النقطة الموافقة للعدد x على الدائرة المثلثية. فتكون النقطة M' الموافقة للعدد $x + 2\pi$ هي النقطة M نفسها أي $M' = M$. لأن قطع مسافة طولها 2π على الدائرة المثلثية يعني الدوران عليها دورة كاملة فترجع إلى النقطة التي انطلقنا منها. ينتج من ذلك أن كلاً من العددين $\cos x$ و $\cos(x + 2\pi)$ يمثل فاصلة M نفسها وعليه $\cos(x + 2\pi) = \cos x$. وبأسلوب مماثل نجد أن كلاً من العددين $\sin x$ و $\sin(x + 2\pi)$ يمثل ترتيب النقطة M ومن ثم

$$\sin(x + 2\pi) = \sin x$$

أياً كان العدد الحقيقي x كان $1 \leq \cos x \leq -1$ و $-1 \leq \sin x \leq 1$. ②




نعلم أن نصف قطر دائرة المثلثية يساوي الواحد وعليه فإن فاصلة النقطة A تساوي 1 في حين أن فاصلة النقطة A' تساوي -1، وبملاحظة أن فاصلة أيّة نقطة من دائرة المثلثية تقع بين فاصلتي A' و A استنتجنا أن فاصلة أيّة نقطة من دائرة المثلثية محصورة بين -1 و 1 ومنه المتراجحة الأولى $-1 \leq \cos x \leq 1$.

ونلاحظ بالمثل أن ترتيب النقطة B يساوي 1 وأن ترتيب النقطة B' يساوي -1 ومن ثم فإن ترتيب أيّة نقطة من دائرة المثلثية يقع بين 1 و -1 وهذا ما يوصلنا إلى المتراجحة الثانية أي

$$-1 \leq \sin x \leq 1$$


أياً كان العدد الحقيقي x كان $\sin(-x) = -\sin x$ $\cos(-x) = \cos x$ و ③



نلاحظ أن النقطة N الممثلة للعدد الحقيقي $-x$ هي نظيره النقطة M الممثلة للعدد x بالنسبة إلى محور الفواصل فلهاتين النقطتين الفاصلة نفسها وترتيبان متعاكسان أي :

$$\sin(-x) = -\sin x \quad \text{و} \quad \cos(-x) = \cos x$$

أياً كان العدد الحقيقي x كان $\sin(x + \pi) = -\sin x$ $\cos(x + \pi) = -\cos x$ و ④




لتكن M النقطة الموافقة للعدد x على دائرة المثلثية. فتكون النقطة N الموافقة للعدد $x + \pi$ هي النقطة المقابلة قطرياً للنقطة M . لأن قطع مسافة إضافية طولها π على دائرة المثلثية يعني الدوران عليها مقدار نصف دورة.

وعليه تكون إحداثيات النقطة N هي $(-\cos x, -\sin x)$. ومنه نستنتج

$$\sin(x + \pi) = -\sin x \quad \text{و} \quad \cos(x + \pi) = -\cos x$$

٥ أيّاً كان العدد الحقيقي x كان $\sin(x + \frac{\pi}{2}) = \cos x$ و $\cos(x + \frac{\pi}{2}) = -\sin x$



لتكن M النقطة الموافقة للعدد x على الدائرة المثلثية. فتكون النقطة N الموافقة للعدد $x + \frac{\pi}{2}$ هي النقطة الموافقة لقطع مسافة إضافية طولها $\frac{\pi}{2}$ على الدائرة المثلثية وهذا يعني الدوران عليها مقدار ربع دورة.

المثلث القائم الذي وتره ON في الشكل المجاور ينتج عن المثلث القائم الذي وتره OM بدوران ربع دورة حول O . فإذا كان $(\cos x, \sin x)$ كان M بما إحداثي

$$\cdot \sin(x + \frac{\pi}{2}) = \cos x \quad \cos(x + \frac{\pi}{2}) = -\sin x \quad \text{و}$$

٦ أيّاً كان العدد الحقيقي x كان $\sin(\frac{\pi}{2} - x) = \cos x$ و $\cos(\frac{\pi}{2} - x) = \sin x$

في الحقيقة، يمكن أن نستنتج هاتين الخاصتين من الخواص السابقة كما يأتي : ليكن x عدداً حقيقياً. نستنتج من ٥ مطبة على $\frac{\pi}{2} - x$ بدلاً من x لأن

$$\sin(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}) = \cos(\frac{\pi}{2}) \quad \text{و} \quad \cos(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}) = -\sin(\frac{\pi}{2})$$

$$\cos(\frac{\pi}{2} - x) = \sin x \quad \text{و} \quad -\sin(\frac{\pi}{2} - x) = \cos x \quad \text{أو}$$

$$\cos(\frac{\pi}{2} - x) = \sin x \quad \text{و} \quad \sin(\frac{\pi}{2} - x) = \cos x$$



١ عِينْ قيمة جيب وجيب تمام الأعداد الحقيقية الآتية. يمكنك البدء بتعيين النقاط الموافقة على دائرة مثلثية.

$$\cdot \frac{13\pi}{6} \quad \text{و} \quad \frac{11\pi}{6} \quad \text{و} \quad \frac{7\pi}{6} \quad \text{و} \quad \frac{5\pi}{6} \quad \text{و} \quad \frac{\pi}{6} \quad ①$$

$$\cdot -\frac{108\pi}{4} \quad \text{و} \quad \frac{81\pi}{4} \quad \text{و} \quad \frac{5\pi}{4} \quad \text{و} \quad \frac{9\pi}{4} \quad \text{و} \quad \frac{\pi}{4} \quad ②$$

$$\cdot -\frac{54\pi}{3} \quad \text{و} \quad \frac{97\pi}{3} \quad \text{و} \quad \frac{71\pi}{3} \quad \text{و} \quad \frac{\pi}{3} \quad \text{و} \quad \frac{4\pi}{3} \quad ③$$

٢ لتكن M النقطة من الدائرة المثلثية C الموافقة لعدد x . عِينْ على C النقاط الموافقة للقياسات $\pi - x$ و $\pi + x$ و $2\pi - x$ ، ثم اخترل الصيغة :


$$\cdot f(x) = \cos x + \cos(\pi - x) + \cos(\pi + x) + \cos(2\pi - x)$$

لقد عرّفنا سابقاً تابعين حقيقين جديدين، معرفتين على كامل مجموعة الأعداد الحقيقية \mathbb{R} هما تابع الجيب $x \mapsto \sin x$ وتابع جيب التمام أو التجيب $x \mapsto \cos x$. سنحاول في هذه الفقرة دراسة هذين التابعين، لقد رأينا آنفًا أن هذين التابعين يأخذان قيمهما في المجال $[1, -1]$.


يمكننا بالاستفادة من الدائرة المثلثية أن ندرس بسهولة اطّراد التابعين \cos و \sin على المجال



$[0, 2\pi]$.



عندما تتحول x في المجال $[0, \pi]$ من 0 إلى π ، تتحول النقطة M على نصفدائرة المثلثية العلوى بالاتجاه الموجب من A إلى A' ، إذ إن طول القوس $\widehat{AA'}$ يساوى π . فاصلة النقطة M تتناقص من $+1$ إلى -1 . إذن تابع التجيب تابعٌ متناقص تماماً على المجال $[0, \pi]$.




وعندما تتابع x تحوّلها في المجال $[\pi, 2\pi]$ من π إلى 2π ، تحوّل النقطة M على نصفدائرة المثلثية السفلى بالاتجاه الموجب عائدة من A' إلى A ، وتزداد فاصلة النقطة M من -1 إلى $+1$.


إذن لتابع التجيب جدول الاطراد التالي على المجال $[0, 2\pi]$:

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\cos x$	1 ↘ 0 ↘ -1 ↗ 0 ↗ 1				


أمّا خطُّه البيانيُّ على هذا المجال فهو كما يأتي :




أمّا تابع الجيب فيتبع تغييرات تراتيب النقاط M .



عندما تتحول x من 0 إلى $\frac{\pi}{2}$ ، تقطع النقطة M ربع الدائرة المثلثية المحتوى في الربع الأول من A إلى B . ويزداد ترتيب M من 0 إلى 1 .



وعندما تتحول x من $\frac{\pi}{2}$ إلى $\frac{3\pi}{2}$ ، تقطع النقطة M نصف الدائرة المثلثية اليساري من B إلى B' ، ويتناقص ترتيب M من 1 إلى -1 .




وأخيراً عندما تتحول x من $\frac{3\pi}{2}$ إلى 2π ، يتزايد ترتيب M من -1 إلى 0 . فتابع الجيب متزايد تماماً على كل من المجالين $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ و $\left[\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right]$.

إذن لتابع الجيب جدول الاطراد التالي على المجال $[0, 2\pi]$:

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\sin x$	0	\nearrow	1	\searrow	0

أمّا خطُّه البيانيُّ على هذا المجال فهو كما يأتي :






لاحظ أنه عندما يتحول x في المجال $[0, 2\pi]$ متزايداً من 0 إلى 2π ، يتحول المقدار $t = x + 2\pi$ في المجال $[0, 2\pi]$ متزايداً من 0 إلى 2π ، ولكن رأينا أن

$$\cos x = \cos(x + 2\pi) = \cos t$$


وهكذا نرى أن الخط البياني لتابع التجيب \cos على $[-2\pi, 0]$ هو نفسه الخط البياني لهذا التابع على $[0, 2\pi]$ بعض إخضاعه لانسحاب كما في الشكل :



والأمر نفسه يسري على تابع الجيب \sin على $[-2\pi, 0]$. نترك لك أن ترسم الخط البياني لتابع الجيب على المجال $[-2\pi, 0]$.



كما قد عرقلنا جيب وتجيب زاوية حادة في دراستنا السابقة، فما علاقة هذين التعريفين بتابعِي الجيب والتجيب اللذين درسناهما في هذا البحث ؟



لنتأمل مثلاً OEF قائماً في E . ثُم لنرسم دائرة ممتلئة مركبها O وبحيث تقع A على نصف المستقيم (OE) . عندئذ يقطع نصف المستقيم (OF) هذه الدائرة في M كما في الشكل المجاور. لتكن L المسقط القائم للنقطة M على (OA) . عندئذ إحداثيا النقطة M هما (OL, LM) .

أي إذا رمزنا بالرمز x إلى قياس الزاوية $\angle AOM$ بالراديان كان


$$\sin x = LM \quad \cos x = OL$$

ونستنتج من تشابه المثلثين القائمين OLM و OEF ومن كون $OM = 1$ أن

$$\sin x = \frac{LM}{OM} = \frac{EF}{OF} = \sin \angle EOF \quad \text{و} \quad \cos x = \frac{OL}{OM} = \frac{OE}{OF} = \cos \angle EOF$$

حيث يشير $\sin \angle EOF$ و $\cos \angle EOF$ إلى التعريف الذي مررت به في دراستك السابقة لكل من تجيب وجيب زاوية حادة اعتماداً على نسبة طول الضلع المجاور إلى طول الوتر، ونسبة طول الضلع المقابلة إلى طول الوتر بالترتيب.

مُرئيات ومسائل



1 رسمنا في معلم متجانس المحنبيات الثلاثة للتتابع الآتية :

- التابع f المعروف على مجموعة الأعداد الحقيقية وفق : $f(x) = x$
- التابع g المعروف على مجموعة الأعداد الحقيقية وفق : $g(x) = x^2$
- التابع h المعروف بشرط $x \neq 0$ وفق : $h(x) = \frac{1}{x}$

بيان الصواب من الخطأ في المقولات الآتية معللاً إجابتك المستوحاة من الرسم البياني :

- ① إذا كان $x > 2$ كان $x^2 > 4$
- ② إذا كان $x^2 > 4$ كان $x > 2$
- ③ إذا كان $0 < x < 1$ كان $x^2 < x$
- ④ إذا كان $x < -1$ كان $\frac{1}{x} < -\frac{1}{2}$
- ⑤ إذا كان $-1 < x < 2$ كان $1 < x^2 < 4$
- ⑥ إذا كان $x < -\frac{1}{2}$ كان $\frac{1}{x} > -2$

2 في كل حالة من الحالات الآتية هناك إجابة واحدة صحيحة فقط، عينها

① أياً كان العدد غير المعدوم a ، فإن $(-2a)^2$ يساوي :

$$2a^2 \quad \text{✌}$$

$$4a^2 \quad \text{✌}$$

$$-4a^2 \quad \text{👉}$$

② إن تحليل المقدار $3x^2 + 8x + 4$ هو :

$$3(x+2)^2 \quad \text{✌}$$

$$(3x+2)(x+2) \quad \text{✌}$$

$$(3x+2)^2 \quad \text{👉}$$

③ إذا كان $-2 < x < 3$ كان :

$$4 < x^2 \quad \text{✌}$$

$$4 < x^2 < 9 \quad \text{✌}$$

$$x^2 < 9 \quad \text{👉}$$

④ التابع f المعروف على \mathbb{R} بالصيغة $f(x) = -3x^2 + 5$ هو :

• متزايد على $[-\infty, 0]$. 👉

• متناقص تماماً على \mathbb{R} . ✌

⑤ التابع f المعروف بالصيغة $f(x) = 4 - (x-3)^2$ يقبل :

• 4 قيمة كبيرة. ✌

• 3 قيمة صغيرة. 👉

فيما يلي، عدّة مقولات، عيّن الصححة منها مُعلّلاً إجاباتك. يمثل القطع المكافئ P في الشكل

3

المجاور تابعاً حدودياً من الدرجة الثانية.


① يمكن تعريف f وفق :

$$f(x) = (x - 2)(x + 1) \quad ①$$

$$f(x) = (1 - x)(2 + x) \quad ②$$

$$f(x) = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{9}{4} \quad ③$$

$$f(x) = x^2 - x - 2 \quad ④$$



② يتحقق كثير الحدود ما يأتي :

. يبلغ قيمته الصغرى عند $x = 0.6$ ①

. قيمته الصغرى هي ②

. أيًّا كان العدد x من المجال $[0, 1]$ كان $f(x) \leq -2$ ③

. أيًّا كان العدد x كان $f(x) + 2 > 0$ ④

4


① ادرس اطّراد التابع المعرف على \mathbb{R}^* وفق $f(x) = \frac{4}{x}$ وارسم خطّه البياني في معلمٍ متجانس.

② أعد السؤال في حالة $f(x) = -\frac{3}{x}$

5 التوابع المُشار إليها فيما يأتي معرفة على \mathbb{R} . اقرن بكلٌ منها خطّه البياني في الشكل الآتي:


$$f_2(x) = -\frac{(x - 2)^2}{2} + 2 \quad ② \quad f_1(x) = x^2 + 2x - 2 \quad ①$$

$$f_4(x) = -\frac{x^2}{2} - 2x + 1 \quad ④ \quad f_3(x) = (x - 1)^2 - 2 \quad ③$$





لنتعلم البحث معاً



6 حل المتراجحات بيانياً

رسمنا في معلم متاجنس الخطوط البيانية الآتية :

$$\cdot f : x \mapsto x^2 - x \quad C_1 \text{ الممثل للتابع}$$

$$\cdot g : x \mapsto \frac{4}{x} \quad C_2 \text{ الممثل للتابع}$$

$$\cdot h : x \mapsto x + 3 \quad C_3 \text{ الممثل للتابع}$$

① حل بيانيًا كلاً من المتراجحات الآتية :

$$x + 3 \geq x^2 - x \quad ③ \quad \frac{4}{x} \geq x^2 - x \quad ② \quad \frac{4}{x} \leq x + 3 \quad ①$$

$$\cdot x^2 - x \leq \frac{4}{x} \leq x + 3 \quad ④$$

نحو الحل

له فهم السؤال. لا يمكننا في الواقع أن نحدّد بيانيًا وبدقّة إحداثيات نقطة تقاطع منحنين إلا إذا كانت هذه الإحداثيات معطاة على الرسم بأسلوب دقيق لا يترك مجالاً للبس، كما هو الحال في هذا التمرين. اقرأ نقط تقاطع المنحنيات مثني مثني.

البحث عن طريق

السؤال ①. نهتم أولاً بالمتراجحة الأولى أي $\frac{4}{x} \leq x + 3$. يهمنا هنا المنحني C_2 و C_3 ،

لناحول تعين العددين $\frac{4}{x}$ و $x + 3$ على الرسم. نعلم أن $\frac{4}{x}$ هو ترتيب نقطة M من المنحني

C_2 فاصلتها x وأن $x + 3$ هو ترتيب نقطة N من المنحني C_3 فاصلتها x . فالمتراجحة

$\frac{4}{x} \leq x + 3$ تعني أن النقطة M واقعة تحت النقطة N . بين ذلك على الشكل.

□ ارسم باللون الأحمر جزء المنحني C_2 الذي يجعل النقطة M تقع تحت النقطة N ، واستنتج مجموعة حلول المتراجحة الأولى.

□ حل بأسلوب مماثل المتراجحتين المتبقيتين واكتب في كل مرة مجموعة الحلول التي حصلت عليها.


السؤال ②. إن البحث عن مجموعة حلول متراجحة مضاعفة يعني البحث عن مجموعة الأعداد الحقيقة المحققة للمتراجحتين معاً. ما هي هذه المجموعة؟

أنجز الحل واكتبه بلغة سليمة.



كتاب المعاذلة الموافقة لمسألة

7



لتكن $[AB]$ قطعة مستقيمة طولها 11 cm، ولتكن M نقطة من القطعة $[AB]$. نرسم في جهة واحدة من المستقيم (AB) مربعين طول ضلع الأول AM وطول ضلع الثاني BM .

① أتوجد نقطة، أو عدة نقاط M ، من القطعة $[AB]$ بحيث يساوي مجموع مساحتي سطحي المربعين المرسومين 65 cm^2 ؟

② أتوجد نقطة، أو عدة نقاط N ، من القطعة $[AB]$ تجعل مجموع مساحتي سطحي المربعين المرسومين أصغر ما يمكن؟

نحو الحل

فهم السؤال. نهتم هنا بمجموع مساحتي المربعين المرسومين انطلاقاً من النقطة M ، ومن الواضح أنَّ هذا المجموع يتعلق بموضع النقطة M على القطعة $[AB]$. لنضع إذن $x = AM$. $0 \leq x \leq 11$.

• احسب بدلالة x مساحة سطح كل من المربعين.

• أثبت أنَّ مجموع مساحتي سطحي المربعين يعطى بالعلاقة: $2x^2 - 22x + 121$.


السؤال ①. يؤول حل هذا السؤال إلى حل معادلة من الدرجة الثانية. اكتبها وحلّها.

السؤال ②. يؤول حل هذا السؤال إلى دراسة اطراد تابع من الدرجة الثانية، ادرسه واستنتج المطلوب.

أنجز الحل واكتبه بلغةٍ سليمة.

حساب نسب مثلثية

8



ليكن x عدداً حقيقياً من المجال $[-\pi, -\frac{\pi}{2}]$ يحقق $\cos x = -\frac{3}{5}$. احسب $\sin x$.

نحو الحل

فهم السؤال

• لتكن C الدائرة المثلثية. إنَّ العدد $\sin x = -\frac{3}{5}$ هو ترتيب نقطتين من الدائرة C . وضعنا على الرسم النقطتين M_1 و M_2 الموافقتين.

- نعلم أن $x \in [-\pi, -\frac{\pi}{2}]$. عند الانتقال على الدائرة C انطلاقاً من النقطة A متوجهين بالاتجاه السالب نجد أن مجموعة النقط M الموافقة لقيم هذا المجال هي القوس $\widehat{A'B'}$. فإذا أخذنا بعين الاعتبار الفرضيتين معاً استنتجنا أن النقطة M_2 هي النقطة المناسبة.

٤ البحث عن طريق

- علينا حساب $\cos x$ مع العلم أن $\sin x = -\frac{3}{5}$ وأن $x \in [-\pi, -\frac{\pi}{2}]$. علينا إذن وفقاً لنتائج المرحلة السابقة حساب فاصلة النقطة M_2 علماً أنها سالبة، وأن $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$.

أنجِزِ الحلَّ واكتبُه بِلُغَةٍ سليمة.



٩ حل مراجحة مثلثية


- لتكن C الدائرة المثلثية. مثل على هذه الدائرة مجموعة النقاط $M(\cos x, \sin x)$ المحققة للشرط $-\frac{1}{2} \leq \cos x \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$. ما الأعداد الحقيقية من المجال $[-\pi, \pi]$ الموافقة لهذه لنقطات M ؟

نحو الحل

فهم السؤال

- تعني المراجحة $-\frac{1}{2} \leq \cos x \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$ أننا نبحث عن النقاط M من الدائرة C التي تقع فاصلة كل منها في المجال $[-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}]$.
- ارسم على $[AA']$ القطعة المستقيمة $[IJ]$ الموافق للمجال $[-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}]$ على أن تكون I النقطة التي فاصلتها $\frac{1}{2}$ و J النقطة التي فاصلتها $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

٤ البحث عن طريق




- نريد تمثيل النقاط M من الدائرة C ، التي تقع فاصلة كل منها في المجال $[-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}]$. ضع على الدائرة النقطة M_1 من القوس $\widehat{AB'}$ والنقطة M_3 من القوس $\widehat{BA'}$ اللتين يكون J مسقطهما القائم على محور الفواصل، ثم ضع النقطتين M_2 من القوس $\widehat{A'B'}$ و M_4 من القوس $\widehat{A'B}$ اللتين تكون I مسقطهما القائم على محور الفواصل.

- لماذا تمثل نقاط القوسين $\widehat{M_4M_3}$ و $\widehat{M_1M_2}$ مجموعة النقاط المطلوبة؟


- علينا الآن تحديد مجموعة الأعداد الحقيقة من المجال $[\pi, \pi]$ الموافقة لنقطات القوسين السابقين. نبدأ بتحديد مجموعة الأعداد الحقيقة الموجبة من المجال $[0, \pi]$ الموافقة لنقطات القوس $\widehat{M_1 M_2}$.

- ما العدد الحقيقي الموافق للنقطة M_2 ? وما العدد الحقيقي الموافق للنقطة M_1 ?
- استنتج أنَّ مجموعة الأعداد الحقيقة الموافقة لنقطات القوس $\widehat{M_1 M_2}$ هي المجال $[\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}]$.
- أثبت بأسلوب مماثل انتلاقاً من النقطة A بالاتجاه السالب أنَّ مجموعة الأعداد الحقيقة من المجال $[-\pi, 0]$ الموافقة لنقطات القوس $\widehat{M_4 M_3}$ هي المجال $[-\frac{2\pi}{3}, -\frac{\pi}{6}]$.

أنجِزِ الحلَّ وَاكْتُبْهُ بِلُغَةٍ سَلِيمَةٍ.



- ليكن $ABCD$ مربعاً طول ضلعه 4 cm. ولتكن M نقطة من $[AB]$. ولتكن N نقطة من $[AD]$ بحيث $AM = DN$. ثم لتكن P نقطة تجعل $AMPN$ مستطيلاً.
- يطلب تعين M تجعل مساحة المستطيل $AMPN$ أكبر ما يمكن.



- لتكن $[AB]$ قطعة مستقيمة طولها 8 cm، ولتكن M نقطة من $[AB]$.
- نُنسئ كما في الشكل المربع $MBCD$ والمثلث القائم المتساوي الساقين AME . نضع $x = AM$ ، ونرمز بالرمز $f(x)$ إلى مساحة المضلع $ABCDE$.

- احسب بدلالة x مساحة كل من المربع $MBCD$ والمثلث AHE وشبيه المنحرف $HMDE$.
- استنتج صيغة $f(x)$.
- على أيِّ مجال I التابع f مُعرَّف؟
- ادرس التابع f على I ، وعيِّن أصغر القيم التي تأخذها مساحة المضلع $ABCDE$.

إذا علمت أنَّ $\cos x \in [\frac{\pi}{2}, \pi]$ وأنَّ $\sin x = \frac{4}{5}$ فأوجد $\cos x$.

إذا علمت أنَّ $\sin x \in [-\frac{\pi}{2}, 0]$ وأنَّ $\cos x = -\frac{1}{3}$ فأوجد $\sin x$.

- في كل من الحالات الآتية، مثل على الدائرة المثلثية مجموعة النقاط M الموافقة لمجموعة الأعداد الحقيقة x التي تحقق :

$$\cos x \leq -\frac{\sqrt{2}}{2} \quad ④ \quad \sin x > \frac{1}{2} \quad ③ \quad \frac{1}{2} \leq \cos x \leq 1 \quad ② \quad 0 \leq \sin x \leq \frac{\sqrt{3}}{2} \quad ①$$

15

احسب في كلٌ من الحالات الآتية القيم الدقيقة لجيب وجيب تمام الزاوية :

$\frac{13\pi}{6}$	$\frac{11\pi}{6}$	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{\pi}{6}$
$\frac{81\pi}{4}$	$\frac{51\pi}{4}$	$\frac{9\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{\pi}{4}$
$\frac{97\pi}{3}$	$\frac{82\pi}{3}$	$\frac{71\pi}{3}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{\pi}{3}$

16

أثبت صحة العلاقات الآتتين وذلك أياً كان العدد الحقيقي x :

$$\cdot (\sin x + \cos x)^2 = 1 + 2 \sin x \cos x \quad ①$$

$$\cdot (1 + \sin x + \cos x)^2 = 2(1 + \cos x)(1 + \sin x) \quad ②$$

$$\cdot \tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \text{ نعرف } \cos x \neq 0 \quad ③$$

17

$$\cdot 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x} \text{ كان } \cos x \neq 0 \text{ الذي يحقق} \quad ④$$

$$\cdot \sin x \cos x = -2 \quad \text{إذا علمت أن } x \text{ تتنمي إلى } \left[-\frac{\pi}{2}, 0 \right] \quad ⑤$$

18

للإجابة عن الأسئلة الآتية، تمكن الاستفادة من الدائرة المثلثية أو من الخطين البيانيين لتابعى الجيب وجيب تمام.

$$\cdot \cos x = \frac{1}{2} \text{ أوجد الأعداد الحقيقة } x \text{ من المجال } \left[-\frac{\pi}{2}, 2\pi \right] \text{ التي تحقق} \quad ⑥$$

$$\cdot \sin x = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ أوجد الأعداد الحقيقة } x \text{ من المجال } \left[-\pi, 2\pi \right] \text{ التي تحقق} \quad ⑦$$

$$\cdot \cos x \geq 0 \text{ أوجد الأعداد الحقيقة } x \text{ من المجال } \left[-\frac{\pi}{2}, 2\pi \right] \text{ التي تحقق} \quad ⑧$$

$$\cdot \sin x \leq \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ أوجد الأعداد الحقيقة } x \text{ من المجال } \left[-2\pi, 3\pi \right] \text{ التي تحقق} \quad ⑨$$

19

عين على الدائرة المثلثية C النقاط الموافقة للقياسات x و $\pi + x$ و $\pi - x$ ، ثم اخترل الصيغة :

$$\cdot g(x) = \sin x + \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + \sin(\pi + x) + \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$$

20

عين على الدائرة المثلثية C النقاط الموافقة للقياسات $5\pi - x$ و $3\pi + x$ و 5π و $\frac{5\pi}{2} - x$ ، ثم اخترل الصيغة :

$$\cdot h(x) = \sin\left(\frac{5\pi}{2} - x\right) + \sin(3\pi + x) + \cos(5\pi - x) + \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$$

21

عين على الدائرة المثلثية C النقطة M إذا علمت أن $\cos x = \frac{3}{5}$ و $\sin x = \frac{4}{5}$. ثم احسب كلًا من :

$$\cdot \sin(\pi - x) \text{ و } \cos(\pi - x) \text{ و } \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \text{ و } \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$$

5

مبادئ في الاحتمالات

مقدمة 

عناصر الاحتمال 

قانون الاحتمال 

كثيراً ما نسمع أو نقرأ في أيامنا هذه، عباراتٍ مثل : احتمال هطول المطر في دمشق غداً 80%， أو إنّ احتمال نجاح العملية الجراحية هو 95%.

انشغل الإنسان منذ القدم بتوقع أحداث تقع في المستقبل، أو بتعبير آخر، بتقدير احتمال وقوع حدث ما في المستقبل وذلك دون أن ترقى هذه الاهتمامات إلى ظهور علم يدرسها.

لقد بدأ الاهتمام بالاحتمال من قبل الرياضيين في القرن السابع عشر لدراسة بعض ألعاب الحظّ ومعرفة النتائج الأكثر احتمالاً في الظهور في لعبة نرد مثلاً.



ازدادت تطبيقات علم الاحتمال كثيراً في عصرنا الراهن فمن الأرصاد الجوية إلى علم الوراثة والصيدلة، إلى حسابات الربح والخسارة في المشاريع الاقتصادية.


في هذا الفصل نقدم مبادئ أولية تعطي فكرة بسيطة عن هذا العلم.

مبادئ في الاحتمالات

مقدمة



عندما نترك كرةً معدنية تسقط بتأثير الجاذبية الأرضية، فإننا نستطيع معرفة المكان الذي ستكون فيه هذه الكرة بعد ثانيةين ونصف، مثلاً. كما يمكننا تحديد اتجاهها وسرعتها في تلك اللحظة. كذلك، يمكننا معرفة نتائج الكثير من التجارب الفيزيائية والكيميائية معرفة مسبقة، إذا كنا على علم بجميع عناصر التجربة. نسمى هذا النوع من التجارب **تجارب أكيدة النتائج**.



ولكن عندما نلقي عشوائياً قطعة نقود على الطاولة، لا يمكننا مسبقاً تحديد الوجه الذي سيظهر عند استقرار قطعة النقود، وكذلك الأمر عندما نلقي نرداً، أو عندما يدور دوّلاب الحظ. في جميع هذه التجارب لا نستطيع مسبقاً معرفة النتيجة لذلك نسمى هذه التجارب **تجارب عشوائية**. يهتم علم الاحتمالات بدراسة هذه التجارب من حيث حصر النتائج الممكنة وأيّها أكثر حظاً بالحدوث.

مثال



لنتأمل تجربة إلقاء حجر نرد رباعي وجوه متوازن، وجوهه مرقمة من 1 إلى 4 (Δ , Δ , Δ , Δ). ولنفترض أنه لا يستقر إلا على أحد جوهه. نتيجة التجربة هي الوجه السفلي للنرد عند استقراره.

① ما هي النتائج الممكنة لهذه التجربة؟

② هل يمكن معرفة حظوظ كل وجه بالظهور؟

الحل

① إن مجموعة النتائج الممكنة لهذه التجربة هي : $\{1, 2, 3, 4\}$ ، نسمى كل نتيجة من هذه النتائج **نتيجة بسيطة** ويسمى الحصول على أي منها **حدثاً بسيطاً** لهذه التجربة التي تسمى بدورها **تجربة عشوائية** لأنّه لا يمكن معرفة نتيجتها قبل انجاز التجربة).

② لمّا كان النرد متوازناً، أمكننا، بغياب أيّ عوامل مؤثرة، افتراض أنّ للجوه المختلفة حظوظاً متساوية في الظهور، وباعتبار أنّ هناك أربع نتائج ممكنة، فيمكننا القول إنّ هناك فرصةً واحدة من أربع لكي نحصل على الوجه "1"، وفرصة واحدة من أربع للحصول على الوجه "2"، وهكذا ...

نستطيع التعبير عن ذلك بالقول إنّ احتمال الحدث $\{1\}$ هو $\frac{1}{4}$ ، واحتمال الحدث $\{2\}$ هو $\frac{1}{4}$ ، وهكذا...

لتأمل تجربة إلقاء نرد رباعي وجوه، وجوهره مرقمة من 1 إلى 4، ولكنه غير متوازن حيث ثقلنا بعض رؤوسه لنزيد من فرص وقوعه على بعض الوجوه.

- ① ما النتائج الممكنة لهذه التجربة؟
 - ② هل يمكن توقع فرص الحصول على أحد الأرقام في هذه التجربة؟

الحل

- ① إنّ مجموعة النتائج الممكنة لهذه التجربة هي : {1,2,3,4} .

② لما كان النرد غير متوازن توازناً تماماً، فلا يمكننا توقع فرص الحصول على كلّ نتيجة ممكنة.

ولكن لنفترض أنّا اختبرنا هذا النرد بـإلقائه 5000 مرّة، وكانت النتائج كما في الجدول الآتي :

4	3	2	1	النتيجة
2990	1010	505	495	عدد مرات ظهورها
$\frac{2990}{5000} \approx \frac{3}{5}$	$\frac{1010}{5000} \approx \frac{1}{5}$	$\frac{505}{5000} \approx \frac{1}{10}$	$\frac{495}{5000} \approx \frac{1}{10}$	التكرار النسبي

ونظراً إلى العدد الكبير للتجارب، يمكننا افتراض أننا لو أعدنا ثانية إجراء العدد نفسه من التجارب فإننا سنحصل على نتائج قريبة من هذه النتائج.

بناءً على ذلك يمكن القول إنّ هناك تقريرياً فرصة واحدة من بين كل عشر فرص كي يقع النرد على الوجه {1}، وفرصة واحدة من بين كل عشر فرص كي يقع النرد على {2}، وفرصتان من بين كل عشر فرص كي يقع النرد على الوجه {3}، وست فرص من بين كل عشر فرص كي يقع النرد على {4}. يعبر الجدول الآتي عن هذه النتيجة :

$\{4\}$	$\{3\}$	$\{2\}$	$\{1\}$	الحدث البسيط
$\frac{6}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	احتماله



- لو أجرينا تجربةً مماثلةً ولكن باستعمال نرد متوازن تماماً، لحصلنا على نتائج متساوية في فرص حصولها أي حوالي 1250 مرةً لكل نتيجة تقريباً.

في المثال الأول، استطعنا، انطلاقاً من تساوي فرص وقوع النتائج المختلفة، تحديد احتمال كل واحدة منها، أما في المثال الثاني فوتحده الجدول الإحصائي أعطانا فكرة عن احتمال حدوث كل نتيجة من نتائج التجربة. وهذا فارق أساسي بين التجارب العشوائية المختلفة.

لاحظ أنه في المثالين السابقين كان لدينا الخاصلتان التاليتان :



- احتمال أي نتيجة هو عدد بين الصفر والواحد.
- مجموع احتمالات النتائج كافية يساوي 1 :

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 1$$

$$\frac{1}{10} + \frac{1}{10} + \frac{1}{5} + \frac{3}{5} = 1$$

٢ عناصر الاحتمال

التجربة العشوائية، الأحداث البسيطة، فضاء العينة.



التجربة العشوائية هي تجربة تُفضي إلى واحدة من **النتائج** دون أن نستطيع تحديد حدوث أي منها مسبقاً. تسمى النتائج الممكنة في هذه التجربة **أحداثاً بسيطة**. وتسمى مجموعة هذه النتائج **فضاء العينة**.

من المهم قبل البدء بأي تمرين احتمالات أن نفهم التجربة العشوائية، ونتائجها الممكنة.



سنعرض فيما يلي ثلاثة أمثلة مهمة لتساعدنا في إيضاح أفكار هذا الدرس.

مثال

① في تجربة إلقاء حجر نرد رباعي الوجوه مرقم من 1 إلى 4 ، نهتم برقم الوجه السفلي. فتكون مجموعة النتائج الممكنة لهذه التجربة : {4,3,2,1} .

② في تجربة إلقاء حجري نرد رباعي الوجوه متماثلين مرقّمين من 1 إلى 4 . نهتم برقمي الوجهين السفليين. فتكون مجموعة النتائج الممكنة لهذه التجربة :

• { (1 & 1), (1 & 2), (1 & 3), (1 & 4), (2 & 2), (2 & 3), (2 & 4), (3 & 3), (3 & 4), (4 & 4) }

③ في تجربة إلقاء حجر نرد رباعي الوجوه مرقم من 1 إلى 4 مرتّبين متاليتين. نهتم بمجموع الرقمين الناتجين. ف تكون مجموعة النتائج الممكنة لهذه التجربة : {8, 7, 6, 5, 4, 3, 2} .

المدّهُ فِي تجربة عشوائية

 مثال

لنَعْدُ إِلَى تجربة رمي حجرٍ نَرَد رباعيَّ الوجه، متماثلين حيث نهتم برقمي الوجهين السفليَّين. قد نهتم بنتائج غير النتائج البسيطة. كأن نسأَل : متى نحصل على رقمين فرديَّين ؟

يقع هذا **الحدَثُ** أي نحصل على رقمين فرديَّين عندما نحصل على إِحدى النتائج البسيطة :
(1 & 1) أو (3 & 3). في مثل هذه الحالة نقول إن المجموعة

$$\{(1 \& 1), (1 \& 3), (3 \& 3)\}$$

هي **حدَثٌ** هو ”الحصول على رقمين فرديَّين“. ويُمكِّننا بأسلوب مماثل، تعريف أحداث أخرى مثل : ”الحصول على رقمين زوجيَّين“ أو ”الحصول على رقمين متساوين“ وهكذا ...
فالمجموعة

$$\{(1 \& 1), (2 \& 2), (3 \& 3), (4 \& 4)\}$$

تقابُل الحدَث : ”الحصول على رقمين متساوين“. والمجموعة
 $\{(1 \& 3), (2 \& 2)\}$

تقابُل الحدَث : ”الحصول على رقمين مجموعهما 4“.

تقابُل كل مجموعه جزئية من فضاء العينة حدَثاً يقع عندما يقع أيٌ من أحداثه البسيطة.

تحريره

نسمَّي **حدَثاً** في تجربة عشوائية كل جزء (أو مجموعه جزئية) من فضاء العينة.

 مثال

في تجربة إلقاء حجر نَرَد رباعي الوجه مرتَّبين. نهتم بمجموع الرقمين الناتجين. عَبَر عن الحدَث $\{6, 7, 8\}$ بجملة. وعيَّن كذلك عناصر الحدَث ”الحصول على رقمين مجموعهما فردي“.

 محل

يُمكن التعبير عن الحدَث $A = \{6, 7, 8\}$ بالجملة : ”الحصول على مجموع أكبر أو يساوي 6“.
أمّا المجموعه المقابلة للحدَث ”الحصول على رقمين مجموعهما فردي“ فهي : $B = \{3, 5, 7\}$.



لنتأمل تجربة **عشوايّة** تعطي إحدى النتائج a_1 أو a_2 أو ... أو a_n ، فيكون **فضاء العينة** الموافق لهذه التجربة هو المجموعة $\{\Omega = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}\}$. حرف يوناني يُقرأ **أومغا**. نسمّي كل مجموعة جزئية من Ω **حدثاً**. ونسمّي كل مجموعة جزئية مكونة من عنصر واحد (مثل $\{a_1\}$) **حدثاً بسيطاً**. وكذلك نسمّي الحدث المؤلف من جميع النتائج الممكنة للتجربة أي $\{\Omega = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}\}$ **الحدث الأكيد**. وأخيراً نسمّي **الحدث المستحيل** الحدث الذي لا يحتوي على أي نتيجة ويقابل المجموعة الخالية : $\{\} = \emptyset$.

تَدْرِبْهُ

① في تجربة إلقاء حجر نرد مكعب الشكل وجوهه مرقمة من 1 إلى 6. نهتم برقم الوجه الظاهر في الأعلى.



① اكتب فضاء العينة.

② عبر بعبارة نصية عن كل من الأحداث الآتية :

- | | | | |
|---------------|---|---------------|---|
| $\{1, 3, 5\}$ | ■ | $\{1, 2, 3\}$ | ■ |
| $\{5, 6\}$ | ■ | $\{2, 4, 6\}$ | ■ |

③ اكتب بصيغة مجموعة جزئية من فضاء العينة كلاً من الأحداث الآتية :

- ”الحصول على عدد أولي“.
- ”الحصول على عدد فردي“.
- ”الحصول على عدد يقبل القسمة على 2 أو 3“.
- ”الحصول على مربع كامل“.

④ عند إلقاء قطعة نقود متوازنة قد تظهر الكتابة التي نرمز إليها T أو الشعار الذي نرمز إليه

H . في تجربة إلقاء قطعة نقود ثلث مرات على التوالي، يمكن التعبير عن النتائج البسيطة لهذه



التجربة بكلمات كل منها مكون من ثلاثة حروف من بين H و T . فمثلاً النتيجة HHH تعني أننا حصلنا على الوجه H في الرميات الثلاث.

① اكتب فضاء العينة.

② اكتب بصيغة مجموعة جزئية من فضاء العينة كلاً من الأحداث الآتية :

- ”الحصول على الكتابة T مرة واحدة فقط“.
- ”الحصول على الشعار H مرتين على الأقل“.

قانون الاحتمال



احتمال حدث بسيط

في تجربة إلقاء حجر نرد رباعي الوجوه **متوازن تماماً** مرقم من 1 إلى 4، نهتم برقم الوجه السفلي. فتكون مجموعة النتائج الممكنة لهذه التجربة : {4,3,2,1}. من البديهي، في هذه الحالة القبول بمبدأ تساوي الفرص بمعنى أن لكل النتائج البسيطة الفرص نفسها في الحدوث وهي فرصة واحدة من أربع. فنقول إن احتمال وقوع أي حدث بسيط في هذه الحالة يساوي $\frac{1}{4}$.

أما في تجربة إلقاء حجري نرد رباعي الوجوه متماثلين **ومتوازنين تماماً** مرقمين من 1 إلى 4. حيث نهتم برقمي الوجهين السفليين. فتكون مجموعة النتائج الممكنة لهذه التجربة :

$$\{(1 \& 1), (1 \& 2), (1 \& 3), (1 \& 4), (2 \& 2), (2 \& 3), (2 \& 4), (3 \& 3), (3 \& 4), (4 \& 4)\}$$

ولكن، بعكس المثال الأول، من غير المنطقي القبول بمبدأ تساوي الفرص هنا، لأننا نرى بسهولة أنه لدينا فرصتين للحصول على النتيجة (1 & 2) مثلاً، مقابل فرصة واحدة للحصول على النتيجة (1 & 1). فكيف نحسب فرص حدوث كل نتيجة من النتائج المختلفة؟ لنضع نتائج الحجرين في جدول كما يأتي :

4	3	2	1	
				النرد الأول
				النرد الثاني
(4 , 1)	(3 , 1)	(2 , 1)	(1 , 1)	1
(4 , 2)	(3 , 2)	(2 , 2)	(1 , 2)	2
(4 , 3)	(3 , 3)	(2 , 3)	(1 , 3)	3
(4 , 4)	(3 , 4)	(2 , 4)	(1 , 4)	4

لما كان كل عمود يقابل نتيجة من نتائج النرد الأول، نستطيع الأخذ بمبدأ تساوي فرص الحصول على أي عمود من الأعمدة.

وكذلك، لما كان كل سطر يقابل نتيجة من نتائج حجر النرد الثاني، نستطيع الأخذ بمبدأ تساوي فرص الحصول على أي سطر من الأسطر. وهكذا، يمكننا القول إن أي خانة من خانات الجدول لها الفرصة ذاتها في الحدوث، أي فرصة واحدة من بين 16. ونستطيع بهذه الطريقة حساب احتمالات الأحداث البسيطة المختلفة، فنكتب :

النتيجة (1 & 1) تقابل خانة واحدة، فاحتمال الحصول عليها يساوي $\frac{1}{16}$ ، كذلك الأمر بالنسبة إلى كل من النتائج (2 & 2) و (3 & 3) و (4 & 4). أمّا النتيجة (1 & 2) فظهر في خانتين من الجدول، واحتمال الحصول عليها يساوي $\frac{2}{16}$. كذلك الأمر بالنسبة إلى كل من النتائج (1 & 3) و (4 & 4) و (2 & 3) و (3 & 4).




لتأمل **تجربة عشوائية** تعطي إحدى النتائج a_1 أو a_2 أو ... أو a_n ، فيكون فضاء العينة الموافق لهذه التجربة هو المجموعة $\{\Omega = a_1, a_2, \dots, a_n\}$. يمكن أن نقرن بكل نتيجة عدداً يمثل احتمال الحصول على هذه النتيجة. فنعرف بذلك ما يسمى **قانون احتمال التجربة العشوائية**.

نرمز عادةً بالرمز p_1 إلى احتمال النتيجة a_1 ، و p_2 إلى احتمال a_2 ، ...، و p_n إلى احتمال a_n . وإذا أردنا أن تكون الرموز أكثر تعبيراً، فإننا نكتب

$$\cdot P(a_1) = p_1, P(a_2) = p_2, \dots, P(a_n) = p_n$$

لاحظنا في الأمثلة التي رأيناها أنَّ هذه الأعداد محصورة بين الصفر والواحد، وأنَّ مجموعها يساوي الواحد.



في تجربة عشوائية تعطي إحدى النتائج a_1 أو a_2 أو ... أو a_n ، يكون احتمال كل نتيجة (حدث بسيط) محصوراً بين الصفر والواحد. أي تنتهي جميع الأعداد p_1, p_2, \dots, p_n إلى المجال $[0, 1]$. ومن جهة أخرى يكون لدينا :

$$p_1 + p_2 + \cdots + p_n = 1$$

فمثلاً إذا عدنا إلى تجربة إلقاء حجرٍ نرد رباعيَّ الوجوه متماثلين ومتوازنين تماماً مرقمين من 1 إلى 4. وجدنا أنَّ

$$P(1 \& 1) = P(2 \& 2) = P(3 \& 3) = P(4 \& 4) = \frac{1}{16}$$

و

$$P(1 \& 2) = P(1 \& 3) = P(1 \& 4) = P(2 \& 3) = P(2 \& 4) = P(3 \& 4) = \frac{2}{16}$$

لاحظ أنَّ الأعداد السابقة جميعها محصورة بين الصفر والواحد وأنَّ مجموعها يساوي الواحد :

$$\cdot 4 \times \frac{1}{16} + 6 \times \frac{2}{16} = 1$$



في تجربة إلقاء حجر نرد رباعي الوجوه **متوازن تماماً** مرقم من 1 إلى 4 مرتبين متتاليتين. نهتم بمجموع الرقمين الناتجين. ما هو قانون الاحتمال في هذه التجربة ؟



لنمثل نتائج هذه التجربة في جدول كما يأتي :

4	3	2	1	النرد الأول النرد الثاني
5	4	3	2	1
6	5	4	3	2
7	6	5	4	3
8	7	6	5	4

وكما ناقشنا سابقاً، لما كان كلُّ عمود يقابل نتيجة من نتائج رمي النرد أول مرة، نستطيع الأخذ بمبدأ تساوي فرص الحصول على أي عمود من الأعمدة.

وكذلك، لما كان كلُّ سطر يقابل نتيجة من نتائج رمي النرد في المرة الثانية، وهذه مستقلة عما حصلنا عليه في المرة الأولى، نستطيع الأخذ بمبدأ تساوي فرص الحصول على أي سطر من الأسطر. وهكذا، يمكننا القول إنَّ أيَّ خانة من خانات الجدول لها الفرصة ذاتها في الحدوث، أي فرصة واحدة من بين 16. ونستطيع بهذه الطريقة حساب احتمالات الأحداث البسيطة المختلفة، فنكتب ما يأتي :

- توافق النتيجة 2 خانة واحدة فاحتمال الحصول عليها يساوي $\frac{1}{16}$. وكذلك الأمر بالنسبة إلى النتيجة 8.
- توافق النتيجة 3 خانتين فاحتمال الحصول عليها يساوي $\frac{2}{16} = \frac{1}{8}$. وكذلك الأمر بالنسبة إلى النتيجة 7.
- توافق النتيجة 4 ثلاثة خانات فاحتمال الحصول عليها يساوي $\frac{3}{16}$. وكذلك الأمر بالنسبة إلى النتيجة 6.
- توافق النتيجة 5 أربع خانات فاحتمال الحصول عليها يساوي $\frac{4}{16} = \frac{1}{4}$. وعلى يميننا تمثيل قانون احتمال هذه التجربة كما يأتي :

8	7	6	5	4	3	2	النتيجة
$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	احتمال وقوعها

التجارب العشوائية متساوية الاحتمال

إنَّ الحالَة التي تكون فيها احتمالات النتائج الممكنة لتجربة متساوية شائعة جدًا، وفي هذه الحالَة يصبح قانون الاحتمال بسيطًا للغاية، لذلك يجدر بنا تمييز هذه الحالَات عند وجودها، ومنه التعريف الآتي :



في تجربة عشوائية، إذا كان للنتائج الممكنة المختلفة كلُّها الاحتمال ذاته، قلنا إنَّ التجربة متساوية الاحتمال. وإذا كان n هو عدد نتائج التجربة كان احتمال كلَّ نتيجة مساوياً $p = \frac{1}{n}$. ذلك لأنَّ مجموع هذه الاحتمالات يجب أن يساوي الواحد.



مثال

① في إحدى السنوات الميلادية غير الكبيسة، سحبنا عشوائياً ورقة من التقويم، ما احتمال أن تكون تلك الورقة ورقة يوم 25 تشرين الأول؟

يوفِّر أحد المطاعم ثلاثة خيارات للصلب الرئيسي من الوجبة وخيارات للحلوى. أخذ أحد الزبائن المترددين عشوائياً صحنًا رئيسيًا ونوعاً من الحلوى.وضح قانون احتمال هذه التجربة العشوائية.

① لما كان لجميع أوراق التقويم الاحتمال نفسه في الظهور، فإن التجربة هنا متساوية الاحتمال، واحتمال كل نتائج (بما فيها ورقة يوم 25 تشرين الأول) يساوي $\frac{1}{365}$.

② لنمثل نتائج التجربة في جدول كما يأتي :

③	②	①	الطبق الرئيسي الحلوى
(① , ③)	(① , ②)	(① , ①)	①
(② , ③)	(② , ②)	(② , ①)	②

إن الحصول على أي عمود له الاحتمال ذاته. كذلك بالنسبة لكل سطر. يمكننا، إذن، القول إن الاحتمال المقابل لكل خانة (كل خانة تمثل نتائج من نتائج التجربة) هو $\frac{1}{6}$.

قانون احتمال تجربة عشوائية غير متساوية الاحتمال




في صندوق ثلاثة كرات سوداء اللون وواحدة بيضاء وكلها متماثلة الملمس. نسحب عشوائياً كرتين على التوالي دون إعادة، ونسجل زوج الألوان معأخذ الترتيب في الحسبان. عين فضاء العينة وقانون الاحتمال لهذه التجربة العشوائية.

إذا رمزا إلى الكرة السوداء بالرمز b ، وإلى الكرة البيضاء بالرمز w ، استطعنا تحديد النتائج الممكنة لهذه التجربة بسهولة فهي $(b \& b)$ و $(w \& w)$ و $(b \& w)$. وبالتالي يكون فضاء العينة لهذه التجربة

$$\Omega = \{(b \& b), (b \& w), (w \& b)\}$$

من الواضح أن هذه التجربة غير متساوية الاحتمال لأن احتمال $(b \& b)$ أكبر من احتمال $(b \& w)$. ولكن للاستفادة من الحالات متساوية الاحتمال، سنرقم الكرات السوداء من 1 إلى 3. وسنعمد إلى تمثيل التجربة المفترضة بمخطط شجري كما يأتي :



يمكّنا هذا المخطط من حساب احتمال كل حدث بسيط، حيث نقبل بمبدأ تساوي الفرص بالنسبة لكل فرع من فروع الشجرة، ونلخص النتائج على النحو الآتي :

$$\cdot \frac{6}{12} = \frac{1}{2} \text{ يساوي احتمال وقوع الحدث البسيط } \{(b,b)\}$$

$$\cdot \frac{3}{12} = \frac{1}{4} \text{ يساوي احتمال وقوع الحدث البسيط } \{(b,w)\}$$

$$\cdot \frac{3}{12} = \frac{1}{4} \text{ يساوي احتمال وقوع الحدث البسيط } \{(w,b)\}$$

وعليه يمكننا تمثيل قانون احتمال هذه التجربة كما يأتي :

(w,b)	(b,w)	(b,b)	النتيجة
$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	احتمال وقوعها

احتمال وقوع حدث في المجموعة العامة

وجدنا في تجربة إلقاء حجر نرد رباعي الوجوه متوازن تماماً مرقم من 1 إلى 4، أن مجموعة النتائج الممكنة لهذه التجربة هي $\Omega = \{4, 3, 2, 1\}$. ورأينا أن احتمال وقوع أي من الأحداث البسيطة يساوي

$$\frac{1}{4} \text{ أي}$$

$$\cdot P(1) = P(2) = P(3) = P(4) = \frac{1}{4}$$

لنتأمل الآن الحدث التالي **«الحصول على عدد زوجي»** الموافق للمجموعة الجزئية $\{2, 4\}$ من Ω ما احتمال وقوع هذا الحدث ؟

لهذا الحدث فرصتان من أصل أربع للوقوع، فاحتمال وقوعه يساوي $\frac{2}{4}$ وهذا يساوي تحديداً مجموع

$$\cdot P(\{2, 4\}) = P(2) + P(4) \text{ أي : } \{2, 4\}$$

وكذلك رأينا في تجربة إلقاء حجري نرد رباعي الوجوه متوازنين تماماً ومتماضيين مرقّمين من 1 إلى 4. أنّ مجموعة النتائج الممكنة لهذه التجربة هي:

$$\Omega = \{(1 \& 1), (1 \& 2), (1 \& 3), (1 \& 4), (2 \& 2), (2 \& 3), (2 \& 4), (3 \& 3), (3 \& 4), (4 \& 4)\}$$

لتأمّل الحدث **”الحصول على رقمين متساوين“** الموافق للمجموعة الجزئية
 $\{(1 \& 1), (2 \& 2), (3 \& 3), (4 \& 4)\}$

من Ω . نلاحظ أنّ لهذا الحدث أربع فرص لوقوع من أصل 16، فاحتمال وقوعه يساوي $\frac{4}{16}$ وهذا يساوي تحديداً مجموع احتمالات وقوع الأحداث البسيطة $\{(1 \& 1)\}$ و $\{(2 \& 2)\}$ و $\{(3 \& 3)\}$ و $\{(4 \& 4)\}$ أي :

$$P(\{(1 \& 1), (2 \& 2), (3 \& 3), (4 \& 4)\}) = P(1 \& 1) + P(2 \& 2) + P(3 \& 3) + P(4 \& 4)$$

أمّا إذا نظرنا إلى الحدث **”مجموع الرقمين يساوي 4“**، الموافق للمجموعة الجزئية
 $\{(1 \& 3), (2 \& 2)\}$ ، فاحتمال وقوعه يساوي

$$\cdot P(\{(1 \& 3), (2 \& 2)\}) = P(1 \& 3) + P(2 \& 2) = \frac{2}{16} + \frac{1}{16} = \frac{3}{16}$$

خاصّة أساسية

في تجربة عشوائية، احتمال وقوع حدث (غير الحدث المستحيل) يساوي مجموع احتمالات وقوع كل الأحداث البسيطة التي يتّألف منها. أمّا الحدث المستحيل \emptyset فاحتمال وقوعه يساوي 0.

مثال

لتأمّل في تجربة إلقاء حجري نرد رباعي الوجوه متوازنين تماماً ومتماضيين مرقّمين من 1 إلى 4. الحدث **”الحصول على رقمين متساوين أو مجموعهما 4“**، الموافق للمجموعة الجزئية

$$A = \{(1 \& 1), (2 \& 2), (3 \& 3), (4 \& 4), (1 \& 3)\}$$

إنّ احتمال وقوع هذا الحدث يساوي

$$\begin{aligned} P(A) &= P(1 \& 1) + P(2 \& 2) + P(3 \& 3) + P(4 \& 4) + P(1 \& 3) \\ &= \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{2}{16} = \frac{6}{16} \end{aligned}$$

ونلاحظ أنّ الحدث A هو اجتماع الحدين : **”الحصول على رقمين متساوين“** و **”مجموع الرقمين يساوي 4“**، ولكن احتمال وقوعه $\frac{6}{16}$ لا يساوي مجموع احتمالي وقوع هذين الحدين :

مثال

في تجربة إلقاء حجر نرد رباعي الوجوه متوازن تماماً مرقم من 1 إلى 4 مرتبين متتاليتين، حيث نهتم بمجموع الرقمان الناتجين. رأينا أنّ فضاء العينة هو $\Omega = \{8, 7, 6, 5, 4, 3, 2\}$. وأنّ قانون الاحتمال يعطى بالجدول الآتي :

النتيجة	8	7	6	5	4	3	2
احتمال وقوعها	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$

احتمال وقوع الحدث $S = \{3, 5, 7\}$ يساوي

$$\cdot P(S) = P(3) + P(5) + P(7) = \frac{1}{8} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{1}{2}$$

أمّا احتمال وقوع الحدث $T = \{6, 7, 8\}$ فيساوي

$$\cdot P(T) = \frac{3}{16} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} = \frac{3}{8}$$

نتيجة مهمة

في تجربة عشوائية متساوية الاحتمال، احتمال وقوع حدث A هو خارج قسمة عدد عناصر الحدث على عدد عناصر فضاء العينة Ω أي :

$$P(A) = \frac{\text{عدد عناصر } A}{\text{عدد عناصر } \Omega}$$

لأنه إذا كان n عدد عناصر Ω كان احتمال أي حدث بسيط $P = \frac{1}{n}$ ، وإذا كان k عدد الأحداث البسيطة التي تؤلف A استنتجنا أن

$$P(A) = \underbrace{\frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \dots + \frac{1}{n}}_{k \text{ مرّة}} = k \times \frac{1}{n} = \frac{k}{n}$$

مثال

سحب ورقة من تقويم ميلادي لسنة غير كبيسة. ما احتمال أن تكون الورقة ليومٍ من شهر شباط؟

المعلم

إنّ التجربة متساوية الاحتمال، وبالتالي يكون احتمال الحدث «الورقة المسحوبة من أوراق شباط»

يساوي عدد أيام شهر شباط مقسوماً على عدد أيام السنة أي $\frac{28}{365}$.

مِرِينَاتٌ وَمُسَائِلٌ



1 في حالة قطعة نقود، نرمز إلى الكتابة بالرمز H وإلى الشعار بالرمز T . نتأمل تجربة إلقاء قطعة نقود متوازنة مرتين متواليتين. أي المقادير التالية يساوي احتمال ظهور الكتابة مرتين:

$$\cdot P(\{TT\}) \quad \textcircled{4} \qquad \cdot \frac{1}{4} \quad \textcircled{3} \qquad \cdot \frac{1}{3} \quad \textcircled{2} \qquad \cdot \frac{1}{2} \quad \textcircled{1}$$

2 يحوي صندوق ثلات كرات متماثلة الملمس، اثنان سوداوان وواحدة بيضاء، نسحب كرتين على التتالي مع إعادة الأولى قبل سحب الثانية. أي الأعداد التالية يساوي احتمال سحب كرتين سوداويين؟

$$\cdot 1 \quad \textcircled{4} \qquad \cdot \frac{4}{6} \quad \textcircled{3} \qquad \cdot \frac{4}{9} \quad \textcircled{2} \qquad \cdot \frac{2}{9} \quad \textcircled{1}$$

3 في صندوق ثلات كرات متماثلة الملمس، اثنان سوداوان وواحدة بيضاء، نسحب كرتين على التتالي دون إعادة الكرة الأولى. أي الأعداد التالية يساوي احتمال سحب كرتين سوداويين؟

$$\cdot 1 \quad \textcircled{4} \qquad \cdot \frac{1}{6} \quad \textcircled{3} \qquad \cdot \frac{3}{9} \quad \textcircled{2} \qquad \cdot \frac{1}{9} \quad \textcircled{1}$$



لنتعلم البحث معاً

الصندوق والكرات (1)

في صندوق كرة بيضاء تحمل الرقم 1، وكرتان زرقاء تحمل إداهاما الرقم 2 وتحمل الثانية الرقم 3، وكرتان سوداوان تحمل إداهاما الرقم 4 وتحمل الثانية الرقم 5. نسحب عشوائياً كرة من الصندوق، وننظر إلى رقمها.

① عين فضاء العينة، وقانون الاحتمال لهذه التجربة العشوائية.

② ما احتمال الحصول على رقم فردي؟

نحو الحلّ

① **فهم السؤال.** المطلوب هو تحديد النتائج الممكنة لهذه التجربة العشوائية وتحديد احتمال حدوث كلّ واحدة منها.

﴿ بحثاً عن طريق . ﴾

- إنّ نتيجة التجربة هي أحد الأرقام المسجلة على الكرات.
- لاحظ أنّ الألوان ليست ذات أهميّة في التجربة.
- هل التجربة متساوية الاحتمال ؟

صُغِّرَ الْخَلَلُ بِلَغَةٍ سَلِيمَةٍ . 

② **فهم السؤال.** إنّ المطلوب هو حساب احتمال وقوع الحدث «الحصول على رقم فرديّ»، لذلك علينا تعين مجموعة النتائج الموافقة لهذا الحدث.

﴿ بحثاً عن طريق . ﴾

- ما هي الأعداد الفردية بين 1 و 5 ؟
- استند من كون التجربة متساوية الاحتمال، واحسب احتمال الحدث المطلوب.

صُغِّرَ الْخَلَلُ بِلَغَةٍ سَلِيمَةٍ . 

الصندوق والكرات (2)

5

في صندوق كرّة بيضاء تحمل الرقم 1 ، وكرتان زرقاء تحمل إداهاما الرقم 2 وتحمل الثانية الرقم 3 ، وكرتان سوداء تحمل إداهاما الرقم 4 وتحمل الثانية الرقم 5 . نسحب عشوائياً كرة من الصندوق، وننظر إلى لونها.

① عَيْنِ فَضَاءَ الْعَيْنَةِ، وَقَانُونَ الْاحْتِمَالِ لِهَذِهِ التَّجْرِيبَةِ الْعَشَوَائِيَّةِ.

② مَا احْتِمَالُ الْحَصُولِ عَلَى لَوْنِ غَيْرِ الْأَزْرَقِ ؟

نحو الحلّ

① **فهم السؤال.** إنّ المطلوب هو تحديد النتائج الممكنة لهذه التجربة العشوائية وتحديد احتمال حدوث كلّ واحدة منها.

﴿ بحثاً عن طريق . ﴾

- إنّ نتيجة التجربة هي أحد الألوان "أبيض"، "أزرق" و"أسود".
- لاحظ أنّ الأرقام ليست ذات أهميّة في التجربة.
- هل التجربة متساوية الاحتمال ؟

صُغِّرَ الْخَلَلُ بِلَغَةٍ سَلِيمَةٍ . 

❸ فهم السؤال. إن المطلوب هو حساب احتمال الحدث "الحصول على لون غير الأزرق"، لذلك علينا تعين مجموعة النتائج الموافقة لهذا الحدث.

❹ بحثاً عن طريق. ماهي الألوان الموافقة للحدث المطلوب؟ وما عدد الكرات من هذه الألوان؟
أكمل الحلّ وصغّه بلغةٍ سليمة.

6 الصندوق والكرات (3)

في صندوق كرة بيضاء تحمل الرقم 1، وكرتان زرقاء تحمل إداهاما الرقم 2 وتحمل الثانية الرقم 3، وكرتان سوداء تحمل إداهاما الرقم 4 وتحمل الثانية الرقم 5. نسحب عشوائياً كرة من الصندوق، ثم نعيدها إلى الصندوق، ونسحب عشوائياً كرة ثانية. نسجل رقمي الكرتين المسحوبتين بالترتيب.

❶ عين فضاء العينة، وقانون الاحتمال لهذه التجربة العشوائية.

❷ ما احتمال الحدث D : "الحصول على الرقم نفسه مررتين"؟

❸ ما احتمال الحدث T : "سحب الرقم 3 في المرحلة الثانية"؟

❹ ما احتمال الحدث S : "الرقم الأول أكبر تماماً من الرقم الثاني"؟

نحو الحلّ

❶ فهم السؤال. إن المطلوب هو تحديد النتائج الممكنة لهذه التجربة العشوائية وتحديد احتمال حدوث كل وحدة منها.

❷ بحثاً عن طريق.

- مثل نتائج التجربة بمخطط شجري. وعبر عن النتائج بثنائيات مثل (2,4) بحيث تكون الخانة الأولى للرقم الأول والثانية للرقم الثاني.
- لاحظ أنّ الألوان ليست ذات أهمية في التجربة.
- هل التجربة متساوية الاحتمال؟

❸ فهم السؤال. المطلوب هو حساب احتمال الحدث : "الحصول على الرقم نفسه مررتين".

❹ بحثاً عن طريق. ما هي النتائج البسيطة الموافقة لهذا الحدث؟ وما عددها؟

❺ النتائج الموافقة للحدث المطلوب هي نتائج من الشكل : (...3). ما عدد هذه النتائج؟ أكمل حساب احتمال الحدث المطلوب.

❻ بأسلوب مماثل لما سبق احسب احتمال الحدث المطلوب.

صوغ الحلّ بلغةٍ سليمة.

الصندوق والكرات (4)

7

في صندوق كرّة بيضاء تحمل الرقم 1، وكرتان زرقاءان تحمل إداهاما الرقم 2 وتحمل الثانية الرقم 3، وكرتان سوداوان تحمل إداهاما الرقم 4 وتحمل الثانية الرقم 5. نسحب عشوائياً كرّة من الصندوق، ولا نعيدها إلى الصندوق، ثم نسحب عشوائياً كرّة ثانية. نسجل رقمي الكرتين المسحوبتين حسب الترتيب.

① عين فضاء العينة، وقانون الاحتمال لهذه التجربة العشوائية.

② ما احتمال الحدث D : "الحصول على الرقم نفسه مرتين"؟

③ ما احتمال الحدث T : "سحب الرقم 3 في المرحلة الثانية"؟

④ ما احتمال الحدث S : "الرقم الأول أكبر تماماً من الرقم الثاني"؟

نسحب عشوائياً ورقة لعب (من لعبة ورق فيها 52 ورقة).

8

① عين فضاء العينة، وقانون الاحتمال لهذه التجربة العشوائية.

② ما احتمال سحب ورقة عليها رقم فردي؟

③ ما احتمال سحب صورة؟

نسحب عشوائياً، ورقة لعب (من لعبة ورق فيها 52 ورقة)، ثم نسحب ورقة أخرى دون

إعادة الأولى.

① عين فضاء العينة، وقانون الاحتمال لهذه التجربة العشوائية.

② ما احتمال سحب العشرتين الحمراوين؟

③ ما احتمال سحب عشرتين؟

تلقي حجر نرد مكعب الشكل وجوجه مرقمة من 1 إلى 6 غير متوازن وهو مصنوع بحيث

يكون احتمال ظهور أي وجه متناسباً مع رقمه.

① ما هو فضاء العينة؟ هل التجربة متساوية الاحتمال؟

② عين قانون الاحتمال لهذه التجربة.

10

11

في صندوق ثلاثة كرات بيضاء مرقمة من 1 إلى 3، وأربع كرات حمراء مرقمة من 1 إلى 4، وخمس كرات سوداء مرقمة من 1 إلى 5. نسحب عشوائياً كرةً من الصندوق.

① ما احتمال سحب كرةٍ حمراء ؟

② ما احتمال سحب كرةٍ رقمها أكبر تماماً من 2 ؟

12

لدي عائلة ثلاثة أطفال. نفترض أن هناك فرصاً متساوية لأن يكون الطفل صبياً أو بنتاً.

① ما احتمال أن يكون الأطفال الثلاثة صبياناً ؟

② ما احتمال أن يكون لدى العائلة صبيان وبنت ؟

③ ما احتمال أن يكون لدى العائلة بنت واحدة على الأقل ؟

④ ما احتمال أن يكون الطفل الثالث بنتاً ؟

13

نلقي حجر نرد مكعب الشكل متوازن وجوهه مرقمة من 1 إلى 6 ثلاثة مرات متالية، ونسجل الأرقام الظاهرة.

① ما احتمال الحصول على الرقم 6 في المرات الثلاث ؟

② ما احتمال الحصول على 4 و 2 و 1 ؟

14

في صندوق 15 كرةً متماثلة الملمس ومرقمة من 1 إلى 15. نسحب عشوائياً كرةً ثم نسحب كرةً ثانية دون إعادة الأولى، ثم نسحب ثلاثة دون إعادة الكرتين السابقتين. نسجل الأعداد التي حصلنا عليها حسب ترتيب السحب.

① ما احتمال الحصول على الثلاثية المرتبة (1,2,3) ؟

② ما احتمال الحصول على 1 و 2 و 3 بأي ترتيب كان ؟

15

في إحدى مسابقات التوظيف، يتضمن اختبار ثلاثة أسئلة كل منها مزود بأربعة إجابات مقترحة منها واحدة صحيحة فقط. يقرر أحد المتقدمين الإجابة عشوائياً عن الأسئلة الثلاثة.

① ما احتمال الحصول على ثلاث إجابات صحيحة ؟

② ما احتمال الحصول على إجابتين صحيحتين فقط ؟

16

في إحدى مسابقات التوظيف، يتضمن اختبار عشرة أسئلة كل منها مزود بأربعة إجابات مقترحة منها واحدة صحيحة فقط. يقرر أحد المتقدمين الإجابة عشوائياً عن هذه الأسئلة.

① ما احتمال الحصول على عشرة إجابات صحيحة ؟

② ما احتمال الحصول بالضبط على تسعة إجابات صحيحة ؟

17

نزل في أحد الفنادق عائلة قوامها أب وأم وثلاثة أطفال؛ صبيان والصغرى ليلي. وضع صاحب الفندق بطاقات تعريفهم في سلة واحدة. وعندما رغب الأبوان مغادرة الفندق لجلب بعض اللوازم، أرسل الأب ابنته إلى صاحب الفندق كي تأتي ببطاقتيهما. وعندما طلبت ليلي من صاحب الفندق بطاقتين، مد الأخير يده إلى السلة التي تحوي البطاقات الخمس وأعطاه عشوائياً اثنتين منها.

① ما هو عدد النتائج المختلفة التي نحصل عليها عند سحب بطاقتين في آنٍ معًا من السلة ؟

② احسب احتمال كلٌ من الأحداث الآتية:

① الحدث A : "تعود البطاقتان إلى الزوجين".

② الحدث B : "تعود البطاقتان إلى الصبيين".


③ الحدث C : "تعود البطاقتان إلى شخصين من جنس واحد".

④ الحدث D : "تعود البطاقتان إلى شخصين من جنسين مختلفين".

18

أُجريَ بواسطة الهاتف استطلاع للرأي شمل 900 شخصاً حول أحد القوانين الصادرة حديثاً،

فكان النتيجة على النحو التالي :



① أكمل الجدول الآتي :

المجموع	رفضوا الإجابة	غير موافقين	موافقون	الرأي	
				النوع	النوع
	0			رجال	رجال
		174	90	نساء	نساء
900				المجموع	المجموع

أراد صحفي كتابة تقرير عن الموضوع فأخذ رقم هاتف أحد الأشخاص المستطلعين واتصل به.

② ما احتمال أن يكون هذا الشخص موافقاً على القانون ؟

③ ما احتمال أن يكون قد رفض الإجابة ؟

④ ما احتمال أن يكون رجلاً موافقاً على القانون ؟

أجرت شركة لاتصالات تحقيقاً إحصائياً في محافظة عدد سكانها 40 000 نسمة، للوقوف على مدى رضا السكان عن خدماتها. قسمت المحافظة إلى ثلاثة مناطق : مركز المحافظة والضواحي والريف.

أظهر التحقيق المعلومات الآتية :

- يقطن 10% من السكان في مركز المحافظة.
- من أصل نسبة 60% القاطنين في الضواحي هناك 6.25% غير راضين عن الخدمات.
- في الريف، يبلغ عدد السكان الراضين عن الخدمات خمسة أضعاف عدد غير الراضين عنها.
- تبلغ النسبة المئوية لغير الراضين في مجمل المحافظة 10%.

① أكمل الجدول الآتي :

الريف	الضواحي	المركز	
			راض
			غير راض

سألنا أحد سكان المحافظة.

- ② ما احتمال أن يكون هذا الشخص من سكان الريف ؟
- ③ ما احتمال أن يكون راضياً عن خدمات الشركة ؟